

# ABE, Acidum lacticum + Acidum salicylicum (89 mg + 89 mg)/g, płyn na skórę, 8g



Cena: 9,40 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	GRUPA INCO S.A.
Substancja czynna	Acidum salicylicum, Acidum lacticum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### ABE, Acidum lacticum + Acidum salicylicum (89 mg + 89 mg)/g, płyn na skórę, 8g

#### Opis:

- Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy.
- Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.
- Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

#### Skład:

- Substancjami czynnymi leku ABE są kwas mlekowy i kwas salicylowy.

- 1 g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu mlekowego, w postaci 90% roztworu kwasu mlekowego i 89 mg kwasu salicylowego.
- Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.

## Wskazania:

- Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

## Działanie:

- Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.
- Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.
- Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku ABE:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne - kwas mlekowy lub kwas salicylowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
- u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki.
- Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę.
- Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.
- **Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.**
- Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków.
- Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
- Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.

- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.
- Chronić przed wyparowaniem.

#### Stosowanie u dzieci

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
- U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

#### Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE

- Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

#### Pominięcie zastosowania leku ABE

- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.
- W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.
- Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
- Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.
- Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.
- Nie należy stosować leku na niezmieloną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.
- W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

#### Stosowanie u dzieci

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
- U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

## Stosowanie innych leków:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Produkt łatwopalny.
- Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.