

Abrea, 75mg, kwas acetylosalicylowy, lek przeciwzakrzepowy, 90tabletek



Cena: 8,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	KRKA
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Abrea 75 mg - 90 tabletek

(Acidum acetylsalicylicum)

Opis:

Abrea - produkt leczniczy stosowany w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi.

Skład:

Substancją czynną jest: kwas acetylosalicylowy

Substancje pomocnicze to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana, skład pierwszej otoczki: talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, sodu dodecylosulfonian, polisorbat 80, skład drugiej otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, karmin (E 120), żółcień pomarańczowa, (E 110), lak aluminiowy.

1 tabletkę zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Dorośli:

- Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: 75-160 mg raz na dobę.
- Zapobieganie udarowi: 75-325 mg raz na dobę.
- Zapobieganie zaburzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną dławicą: 75-160 mg raz na dobę.
- Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych: 75-160 mg raz na dobę.

Wskazania:

Przyjmowanie leku Abrea może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też zapobiega późniejszym:

- zawałom serca
- udarom mózgu
- chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Abrea stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Działanie:

Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep krwi, następuje zatrzymanie przepływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
- jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,
- jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz: Lek Aspirin Cardio a inne leki),
- w ostatnim trymestrze ciąży,

- u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a - rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- nudności, wymioty, biegunka,
- niestrawność,
- zwiększona skłonność do krwawienia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- pokrzywka,
- katar,
- trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit,
- skurcze w dolnej części układu oddechowego,
- zapalenie naczyń krwionośnych,
- wybroczyny z fioletowymi plamami,
- nieprawidłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.

Działania niepożądane o nieznanym częstości:

- dzwonięcie w uszach,
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- wrzód żołądka lub dwunastnicy,
- zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek **Abrea** nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.
- Istnieje zwiększone ryzyko krwotoku i wydłużonego czasu krwawienia, szczególnie podczas lub po zabiegu chirurgicznym,

- Lek **Abrea** nie jest zalecany podczas obfitego krwawienia miesięczkowego, ponieważ może on nasilać krwawienie.
- Należy stosować ostrożnie w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Jednoczesne spożywanie alkoholu i kwasu acetylosalicylowego zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży nie powinny stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz. W czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży nie należy przyjmować leku **Abrea**, chyba że jest to zalecone przez lekarza, a dawka nie powinna wtedy być większa niż 100 mg na dobę. Regularne przyjmowanie leku lub przyjmowanie dużych jego dawek w czasie ostatnich miesięcy ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.
- Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Stosowany u dzieci, kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye'a. Jest to bardzo rzadka choroba, która dotyczy mózgu i wątroby i może powodować zagrożenie życia. Z tego powodu leku **Abrea** nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Lek **Abrea** nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Abrea może wchodzić w interakcje z:

- metotreksat,
- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego,
- leki przeciwzakrzepowe i trombolityczne,
- leki przeciwplatekcyjne,
- leki przeciwcukrzycowe,
- digoksyna i sole litu,
- NLPZ,
- alkohol.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować po upływie terminu ważności
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Hiszpania, Barcelona

Import równoległy:

KRKA , Słowenia

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.