

ACC tabletki musujące 200 mg x 20 tabletek



Cena: 21,59 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sandoz
Substancja czynna	Acetylcysteinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

ACC, 200 mg - 20 tabletek musujących

(Acetylcysteinum)

Opis produktu:

ACC Optima to lek mukolityczny, który działa bezpośrednio na zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę.

Skład:

- **Substancja czynna** - acetylocysteina
- **Substancje pomocnicze** - kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu węglan bezwodny, mannitol, laktoza bezwodna, kwas askorbowy, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, aromat jeżynowy B

Wskazania:

- Lek ACC stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych utatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Działanie:

- mukolityczne
- ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych
- zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat:

- 1 tabletkę ACC dwa lub trzy razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

- 1 tabletkę ACC dwa razy na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- Uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
- Ostry stan astmatyczny

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy)
- ból głowy, szumy uszne
- przyspieszone bicie serca (tachykardia); obniżone ciśnienie tętnicze krwi
- nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- niestrawność
- duszność
- skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego
- krwotok

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku występowania (obecnie lub w przeszłości):

- astmy
- niewydolności oddechowej
- choroby wrzodowej
- problemów z odkrztuszaniem

należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku

Lek zawiera laktozę

Dzieci i młodzież:

- Leku ACC nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Lek ACC Optima można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie należy stosować leku ACC z lekami przeciwkaszlowymi
- Lek może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów
- Lek może osłabiać działanie niektórych antybiotyków. Należy go przyjmować 2h po zażyciu antybiotyku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.