

Acerin, płyn, na odciski, zgrubiała skóra, 8g

Cena: 11,90 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Acidum salicylicum, Acidum lacticum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

ACERIN (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę - 8g

(Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Opis produktu:

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne – kwas salicylowy i kwas mlekowy. **Kwas salicylowy** działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiającego złuszczenie. **Kwas mlekowy** jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Skład:

- **Substancje czynne:** kwas salicylowy i kwas mlekowy
- **Substancje pomocnicze** - koloksylina, kalafonia, aceton, octan n-butylu.

1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego.

Wskazania:

- Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

Działanie:

- Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne – kwas salicylowy i kwas mlekowy.
- Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.
- Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

- Lek Acerin nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze.
- Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry. Poczekać aż lek dobrze wyschnie.
- Nakładanie leku, w razie konieczności powtarzać przez kilka dni.
- Następnie należy ponownie wymoczyć nogi i usunąć odcisk.
- Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować Acerin:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia układu krążenia,
- jeśli skóra w otoczeniu odciska jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo,
- u dzieci,
- doustnie,
- na twarz i w okolicy narządów płciowych.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

- Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia
- niepokojących objawów, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się
- z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku Daktrin, krem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.
- Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe.
- W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może spowodować oparzenia.
- Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.
- Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.
- Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć je wodą.
- Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie: „Ostrożnie z ogniem”.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dzieci

- Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w suchym pomieszczeniu.
- Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
- oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
- farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
- środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.