

Aescin 20 mg x 90 tabletek Teva



Cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Teva
Substancja czynna	Escinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Aescin 20 mg - 90 tabletek powlekanych

(Escinum)

Opis produktu:

Aescin to lek o działaniu przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym a także poprawiający stan napięcia naczyń krwionośnych

Składniki:

- **Substancja czynna** - alfa-escyna (Escinum)
- **Substancje pomocnicze** - laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian. Otoczką: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwienna

1 tabletkę zawiera 20 mg alfa-escyny

Wskazania:

- leczenie przewlekłej niewydolności żylną, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu

- leczenie zapalenia żył kończyn dolnych
- profilaktyka i leczenie krwiałków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych

Działanie:

- działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych
- zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych
- wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych
- powoduje szybsze wchłanianie krwiałków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu)
- poprawia krążenie żyłno-limfatyczne
- stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żyłaków kończyn dolnych

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych:

- 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu
- profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym
- po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę
- w przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie stosować leku jeśli:

- pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
- u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem)
- tachykardia
- nadciśnienie tętnicze
- reakcje nadwrażliwości
- krwotok z dróg rodnych

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów):

- zawroty głowy, ból głowy
- nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku

W przypadku wystąpienia powyższych reakcji, w szczególności krwawienia i pierwszych reakcji nadwrażliwości (wysypka skórna) należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po zastosowaniu leku wystąpią:

- zapalenie skóry
- zapalenie zakrzepowe żył
- podskórne stwardnienia (grudki pod skórą), wrzody skórne, ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi
- nagły obrzęk jednej lub obu nóg
- niewydolność serca lub nerek

Istotne jest, aby zastosować się do wszelkich innych nieinwazyjnych środków zalecanych przez lekarza, takich jak bandażowanie nóg, noszenie uciskowych pończoch, okłady z zimnej wody.

- **Lek zawiera laktozę jednowodną oraz żółcień pomarańczową** Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Ze względu na obecność żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- **Aescin** może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych
- Niektóre antybiotyki – cefalosporyny mogą nasilać działanie leku

- Należy unikać jednoczesnego podawania leku **Aescin** z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Ciąża oraz karmienie piersią stanowią przeciwwskazanie do stosowania **Aescin**

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Emilii Plater 53 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.