

Aflavic Max ,tabletki, ból nóg, hemoroidy, nocne kurcze, ciężkość nóg, 30 sztuk



Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfarmex
Substancja czynna	Diosminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Aflavic Max 1000 mg - 30 tabletek

(Diosminum)

Opis produktu:

Aflavic Max 1000 mg to lek w postaci beżowych, podłużnych tabletek z podziałką. Substancją czynną leku Aflavic Max jest zmikronizowana diosmina, która działa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, normuje przepuszczalność naczyń oraz chroni naczynia.

Skład:

- Substancją czynną jest - zmikronizowana diosmina 1000 mg,
- Substancje pomocnicze - kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy (8-88), talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

1 tabletkę zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy

Wskazania:

Lek Aflavic Max 1000 mg stosuje się:

- przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):
- uczucie ciężkości nóg,
- ból nóg,
- nocne kurcze.
- leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Działanie:

- Diosmina działa ochronnie na naczynia krwionośne i poprawia napięcie żył.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 1 tabletkę na dobę, podczas posiłku.
- Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.
- Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- biegunka,
- niestrawność,
- nudności,
- wymioty,
- zawroty głowy,
- ból głowy,
- złe samopoczucie,

- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),
- świąd,
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Aflavic Max jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała.
- Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.
- Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić:

- Lek należy przyjmować podczas posiłków

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.