

Aflofarm Hydrocortisonum 5mg /g krem, 15g



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Hydrocortisonum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hydrocortisonum Aflofarm 5 mg/ g, krem, 15 g

(Hydrocortisoni acetas)

Opis produktu:

Hydrocortisonum Aflofarm to lek w postaci kremu, przeznaczony do stosowania miejscowego. Jego substancją czynną jest octan hydrokortyzonu, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Skład:

- **Substancja czynna** - hydrokortyzonu octan 5 mg,
- **Substancje pomocnicze** - makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

1 g kremu zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu.

Wskazania:

Hydrocortisonum stosuje się w miejscowym leczeniu:

- atopowego zapalenia skóry, (wypyrsk alergiczny, pokrzywka)

- liszaja rumieniowatego,
- rumienia wielopostaciowego,
- liszaja płaskiego o nasilonym świądzie,
- łojotokowatego zapalenia skóry,
- różnego rodzaju wyprysku, zwłaszcza zliszajowaciatego,
- łuszczycy owłosionej skóry głowy oraz zadawnionej,
- świerzbiączki,
- oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, również oparzeń słonecznych,
- ukąszeń owadów.

Lek Hydrocortisonum jest również polecany jako kontynuacja leczenia po zakończonym leczeniu silnie działającymi glikokortykosteroidami.

Działanie:

- Przeciwzapalne, przeciwświądowe, obkurczające naczynia krwionośne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia** o ile lekarz nie zaleci inaczej cienką warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę 2 lub 3 razy na dobę.
- Na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.
- Nie stosować na zdrową skórę.
- Nie stosować na duże powierzchnie skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.
- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Jeśli objawy nasilą się lub nie ma poprawy po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku:

- Uczulenie na hydrokortyzonu octan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, lub grzybica układowa.
- Trądzik zwykły lub trądzik różowaty.
- Atrofia (zanik) skóry.

- Nowotwór skóry lub stan przednowotworowy skóry.
- Zapalenie skóry okolicy ust.
- Zmiany gruzlicze skóry.
- Otwarte rany i uszkodzona skóra.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry lub pod opatrunkiem oraz u dzieci może spowodować wystąpienie następujących objawów niepożądanych:

- zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze,
- nawrót zakażenia,
- plamica posteroïdowa (przebarwienia i odbarwienia skóry),
- powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych,
- trądzik,
- zapalenie skóry w okolicy ust,
- zapalenie skóry w okolicy oczu,
- zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie,
- opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń,
- nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe,
- wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze),
- podrażnienie skóry, takie jak: pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość, alergia kontaktowa,
- jaskra lub zaćma - w przypadku stosowania leku na skórę powiek,
- zahamowanie czynności osi podwzgórze – przysadka – nadnercza,
- zespół Cushinga,
- zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci,
- hiperglikemia, cukromocz.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma cukrzycę - leku nie należy stosować przez długi okres,
- jeśli pacjent ma jaskrę lub zaćmę, gdyż lek stosowany na powiekę lub na skórę w okolicy powiek może spowodować nasilenie objawów choroby,
- jeśli pacjent ma łuszczycę, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować nawrót choroby.

Podczas stosowania leku należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

- nie należy stosować dużych dawek leku, na dużą powierzchnię skóry oraz przez długi czas, ponieważ kortykosteroidy wchłaniają się do krwi i mogą spowodować wystąpienie objawów niepożądanych,
- jeśli w miejscu stosowania leku wystąpi zakażenie skóry, należy skontaktować się z lekarzem,
- unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi,
- lek może być stosowany na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych, ponieważ lek szybciej się wchłania w tych miejscach i istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych. W takich przypadkach należy porozumieć się z lekarzem,
- po nałożeniu leku na skórę nie należy przykrywać tego miejsca żadnym opatrunkiem (zwłaszcza folią czy ceratką), ponieważ nasila to wchłanianie leku,

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek może być stosowany w ciąży krótkotrwale i na małe powierzchnie jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
- Szczególnie ostrożnie zaleca się stosowanie w pierwszych 3. miesiącach ciąży.
- W okresie karmienia piersią lek powinien być stosowany ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry.
- Nie wiadomo, czy stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12. lat bez porozumienia z lekarzem. Istnieje ryzyko zaburzenia wzrostu i rozwoju dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie jest znany wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

Lek zawiera:

- alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu
- Alkohol cetylowy i alkohol stearylowy mogą powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

- Parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie są znane interakcje kremu z innymi lekami.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie zamrażać

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.