


# Akneroxid 5, 50mg/g, żel do stosowania na skórę, trądzik, 50g



Cena: 31,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Almirall
Substancja czynna	Benzoylis peroxidum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Akneroxid 5, 5% żel do stosowania na skórę, 50 g

(Benzoylis peroxidum)

## Opis produktu:

Akneroxid 5 to produkt leczniczy w postaci **żelu stosowany miejscowo na skórę w trądziku pospolitym**. Akneroxid 5 zawiera nadtlenuk benzoilu, którego działanie polega na hamowaniu rozwoju bakterii beztlenowych, będących jedną z przyczyn powstawania trądziku.

## Skład:

Substancją czynną jest benzoilu nadtlenuk (Benzoylis peroxidum).

Substancje pomocnicze: makrogolu eter laurylowy, karbomer 940, sodu wodorotlenek, kwas edetynowy, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 50 mg benzoilu nadtlenuku.

## Wskazania:

- Akneroxid 5 stosuje się w terapii trądziku pospolitego.

## Działanie:

- **Akneroxid 5** powoduje **hamowanie rozwoju bakterii beztlenowych** *Propionibacterium acnes*, które są jedną z **przyczyn powstawania trądziku pospolitego a także bakterii z rodzaju *Micrococcaceae***. Ponadto, nadtlenek benzoliu stosowany na skórę działa przeciwłojotokowo oraz złuszcząco.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Akneroid 5** stosuje się miejscowo na skórę.
- Przed zastosowaniem leku należy najpierw dokładnie oczyścić twarz. Nakładać cienką warstwę żelu tylko na chorobowo zmienioną skórę. Po aplikacji produktu leczniczego należy umyć ręce.
- Okres leczenia zwykle wynosi od 4 do 10 tygodni.

**Dawkowanie:** zwykle żel stosuje się 1 do 2 razy na dobę.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

Nie należy stosować leku **Akneroxid 5**:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną nadtlenek benzoilu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- na uszkodzoną skórę,
- do oczu,
- na błony śluzowe,
- w okolicach ust, nosa lub oczu,
- na skórę suchą i łojotokową,
- u osób z atopowym zapaleniem skóry.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pierwszych dniach stosowania leku **Akneroxid 5** może wystąpić niewielkie zaczerwienienie oraz uczucie napięcia skóry, które zwykle ustępuje podczas leczenia.

Umiarkowane złuszczenie się naskórka utrzymuje się przez cały okres terapii. W przypadku, gdy nadmierne zaczerwienienie albo uczucie pieczenia utrzymuje się przez okres ponad 5 dni, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 na 1000 osób):

- nasilenie suchości skóry.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób)

- alergia kontaktowa.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Akneroxid 5** może wchodzić w interakcje z:

- lekami dermatologicznymi drażniącymi skórę, wysuszającymi, złuszcżającymi lub zawierającymi substancje o właściwościach redukujących.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podczas leczenia produktem **Akneroxid 5** należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (światło słoneczne, solarium) leczonych obszarów.
- Należy unikać aplikacji żelu w okolicach brwi, brody, na granicy skóry głowy z włosami oraz kontaktu z odzieżą, gdyż **Akneroxid 5** posiada właściwości wybielające.
- Po aplikacji produktu leczniczego należy umyć ręce.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Ciąża:**

- Leku **Akneroxid 5** nie należy stosować w ostatnim miesiącu ciąży. W pozostałych miesiącach o możliwości stosowania żelu decyduje lekarz.

**Karmienie piersią:**

- W okresie karmienia piersią lek **Akneroxid 5** można stosować za zgodą lekarza.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 6 miesięcy.

## Podmiot odpowiedzialny:

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3, Niemcy

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.