

Alantan maść 30g allantoinum problemy skórne



Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Substancja
czynna Allantoinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Maść Alantan 30g (20 mg/g)

(Allantoinum)

Opis produktu:

Alantan to produkt leczniczy o działaniu nawilżającym do stosowania w nadmiernym rogowaceniu skóry, wspomagająco w leczeniu ran.

Skład:

Substancją czynną jest alantoina (Allantoinum). 1 g maści zawiera 20 mg alantoiny.

Substancje pomocnicze:

Ianolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Wskazania:

Maść **Alantan** stosuje się w przypadku:

- leczenia trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
- leczenia przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczeniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),
- leczenia płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Działanie:

- Zawarta w **Alantanie** alantoina wpływa na skórę poprzez:

Stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny

- działanie keratolityczne (złuszczające),
- stymulację wzrostu nowej tkanki,
- działanie osłaniające na skórę,
- poprawę nawilżenia skóry.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maść **Alantan** jest przeznaczona do stosowania miejscowego na skórę.

Alantan należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować maści **Alantan**?

- jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- do oczu,
- na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- reakcje nadwrażliwości,
- podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Ze względu na zawartość lanoliny, glikolu propylowego, etylu parahydroksybenzoesu, produkt może powodować miejscowe podrażnienie skóry.
- Lek **Alantan** można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, Warszawa

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.