

Alantan maść nawilżająca 100 g



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Unia
Substancja czynna	Allantoinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Alantan maść (20 mg/g), 100g

(Allantoinum)

Alantan to produkt leczniczy o działaniu nawilżającym do stosowania w nadmiernym rogowaceniu skóry, wspomagająco w leczeniu ran.

Skład:

Substancją czynną jest allantoina (Allantoinum). 1 g maści zawiera 20 mg allantoiny.

Substancje pomocnicze:

Ianolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Wskazania:

Maść Alantan stosuje się w przypadku:

- leczenia trudno gojących się ran, oparzeń (także słonecznych),
- leczenia przewlekłych stanów zapalnych skóry przebiegających z nadmiernym złuszczeniem i rogowaceniem (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca i inne choroby skóry),

- leczenia płytkich owrzodzeń, ubytków skóry i błon śluzowych.

Działanie:

- Zawarta w **Alantanie** alantoina wpływa na skórę poprzez:

Stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny

- działanie keratolityczne (złuszczające),
- stymulację wzrostu nowej tkanki,
- działanie osłaniające na skórę,
- poprawę nawilżenia skóry.

Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Maść **Alantan** jest przeznaczona do stosowania miejscowego na skórę.
- **Alantan** należy delikatnie nakładać na zmienione chorobowo miejsca 2 do 3 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Niewielką ilość maści można nałożyć na jałowy kompres i przyłożyć na oczyszczoną ranę. Opatrunek należy zmieniać raz do dwóch razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować maści **Alantan**?

- jeśli pacjent ma uczulenie na alantoinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- do oczu,
- na ostre stany zapalne skóry, przebiegające z wysiękiem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- reakcje nadwrażliwości,
- podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Ze względu na zawartość lanoliny, glikolu propylowego, etylu parahydroksybenzoesu, produkt może powodować miejscowe podrażnienie skóry.
- Lek **Alantan** można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

Adres: ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa

E-mail: unia@uniapharm.pl