

Alax, zaparcia x 20 tabletek



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Rhamnus frangula, Aloe sp.
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Alax na zaparcia - 20 tabletek drażowanych

(Aloe capensis + Frangulae corticis extractum siccum)

Opis produktu:

Alax to produkt leczniczy roślinny do stosowania krótkotrwałego w sporadycznie występujących zaparciach

Skład:

- **Substancja czynna** - wysuszony i sproszkowany sok z Aloe barbadensis Miller i/lub Aloe ferox Miller, folium (liści aloesu) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 18% oraz wyciąg suchy z Rhamnus frangula L., cortex (kory kruszyny), DER 5-8:1, ekstrahent: metanol) o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15%
- **Substancje pomocnicze** - rdzeń: celuloza mikrokryształiczna z krzemu dwutlenkiem koloidalnym, laktoza, kroskarmeloza sodowa, powidon, magnezu stearynian; składniki otoczek: sacharoza, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba, czerwień koszenilowa (E 124)

1 tabletkę drażowaną zawiera 35 mg sproszkowanego soku z liści aloesu (Aloe capensis) oraz 42 mg wyciągu suchego kory kruszyny (Frangulae corticis extractum siccum), czyli 10-15 mg antrazwiązków w przeliczeniu na aloinę

Wskazania:

- do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach

Działanie:

- pochodne antracenu zawarte w produkcie Alax wykazują działanie przeczyszczające
- aloina pobudza motorykę jelita grubego (przyspiesza pasaż treści jelitowej) oraz zwiększa wydzielanie płynów do światła jelita

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Młodzież w wieku ponad 12 lat, dorośli, osoby w podeszłym wieku:

- wieczorem 1-2 tabletki drażowane popić szklanką wody

zwykle wystarcza przyjmowanie preparatu nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu

właściwa pojedyncza dawka to najmniejsza dawka powodująca niewymagające wysiłku wypróżnienie w postaci miękkiego stolca

nie przekraczać dawki dobowej 30 mg antrazwiązków co odpowiada w przybliżeniu 2 tabletkom na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- nie stosować preparatu w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub uczulenia na którykolwiek składnik produktu
- niedrożność jelita i zwężenie jelita, atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
- ból brzucha nieznanego pochodzenia
- ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów
- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznaną:

- reakcja nadwrażliwości
- bóle brzucha, płynne stolce
- zaburzenia wodno-elektrolitowe, albuminuria, hematuria
- zmiany pigmentowe śluzówki
- żółte lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Alax zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową, która może powodować alergie
- W przypadku stosowania glikozydów nasercowych, korzenia lukrecji, diuretyków, kortykosteroidów należy przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem
- Nie stosować w przypadku zaciopowania jelita, niezdiagnozowanych, ostrych lub utrzymujących się dolegliwościach jelitowo-żołądkowych (ból brzucha, nudności, wymioty)
- Należy unikać przewlekłego stosowania produktów przeczyszczających - może prowadzić do upośledzenia funkcji jelit (atonia jelit)
- W przypadku osób z zaburzoną funkcją nerek, może dochodzić do zaburzeń elektrolitowych
- W przypadku nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinno stosować się produktu Alax

Ciąża, karmienie piersią:

- nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży
- nie zaleca się stosowania w trakcie karmienia piersią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Alax może wchodzić w interakcje z:

- z lekami powodującymi hipokaliemię (np. diuretyki, kortykosteroidy, produkty z korzenia lukrecji)

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47-51 61-896 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.