

Allertec Fexo, lek, przeciwalergiczny, katar, kichanie, zaczerwienienie, łzawienie oczu, 10 tabl.



Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Fexofenadinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Allertec Fexo 120 mg 10 tabletek powlekanych

(Fexofenadini hydrochloridum)

Opis produktu:

Allertec Fexo jest lekiem w postaci tabletek powlekanych zawierającym jedną substancję czynną: chlorowodorek feksofenadyny zaliczany do leków przeciwhistaminowych. Tabletki Allertec Fexo są odpowiednie do stosowania u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku 12 lat i starszych. Zalecana dawka dobową preparatu to 1 tabletkę, zawierającą 120 mg substancji czynnej. Co ważne działanie leku przeciwalergicznego utrzymuje się do 24 godzin.

Skład:

Substancją czynną leku jest :

-

feksofenadyny chlorowodorek 120 mg, co odpowiada 112 mg feksofenadyny,

Substancje pomocnicze to:

- celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, powidon K 30, magnezu stearynian, otoczka Opadry Pink 03C54667 (hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)).

Każda tabletką zawiera 120mg feksofenadyny chlorowodoru, co odpowiada 112 mg feksofenadyny,

Wskazania:

- objawowe leczenie sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz pokrzywki. Do typowych objawów kataru siennego zaliczane jest **kichanie, swędzenie nosa, uczucie zatkanego nosa jak również swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.**

Działanie:

Allertec Fexo jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 1 tabletką (120 mg) raz na dobę.
- Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą.
- Leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku wątpliwości dotyczących dawkowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Allertec Fexo, jeśli wystąpią: **obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.**

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

- bóle głowy
- senność
- zawroty głowy
- nudności

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

- zmęczenie

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- trudności w zasypianiu (bezsennność), zaburzenia snu, koszmary senne/wyraziste sny,
- nerwowość,
- przyspieszona lub nieregularna czynność serca,
- biegunka,
- wysypka skórna, świąd, pokrzywka,
- ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu,
- uczucie ucisku w klatce piersiowej,
- nagłe zaczerwienienie skóry.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjęcie leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Allertec Fexo poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku; zaleca się zachowanie około 2-godzinnej przerwy między przyjęciem leków zobojętniających a podaniem leku Allertec Fexo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Rozpoczęcie stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, w szczególności w przypadku gdy:

- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
- u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia (lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca),
- pacjent jest w podeszłym wieku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, co oznacza, że uznaje się za „wolny od sodu”.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Leku nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
- Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
- Brak jest danych dotyczących wpływu leku na płodność u mężczyzn i kobiet.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

-

Nie należy przyjmować leku razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku Allertec Effect

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.
- Pacjenci mogą prowadzić pojazdy i wykonywać zadania wymagające koncentracji.
- Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy.
- W przypadku, gdy wystąpią w/w objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.