

Alliofil, 30 tabletek dojelitowych



Cena: 13,70 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	POZNAŃSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Allium sativum, Urtica dioica
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Alliofil 200 mg + 53,5mg, 30 tabletek dojelitowych

(Allii sativi bulbus + Urticae folium)

Opis produktu:

- Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Skład:

- Substancjami czynnymi leku** są: 200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica dioica L., folium (liść pokrzywy).
- Substancje pomocnicze:** celuloza mikrokryształiczna z krzemionką koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroscarmelozę sodową, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, glikol propylenowy, lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 10
- 1 tabletki zawiera:** sproszkowaną cebulę czosnku (Allii sativi bulbus) 200 mg; sproszkowany liść pokrzywy (Urticae folium) 53,5 mg.

Wskazania:

- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany profilaktycznie i wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe)

Działanie:

- Składniki czosnku zmniejszają stężenie lipidów i glukozy we krwi oraz posiadają właściwości przeciwbakteryjne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych:

- Dorośli: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.

Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe):

- Dorośli: 3 razy dziennie 1 do 3 tabletek.

Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie zaleca się stosowania, dopuszcza się stosowanie u młodzieży po konsultacji z lekarzem.

Czas stosowania: W celach profilaktycznym lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6 miesięcy.

W przypadku stosowania produktu w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję czynną
- Uczulenie na związki siarkowe, niewydolność wątroby, astma oskrzelowa, alergie pokarmowe.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie oddechowych i skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podczas stosowania preparatu Alliofil związki siarkowe wydalane są przez skórę z potem i przez płuca. Powoduje to zmianę zapachu skóry i oddechu

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.
- Nie zaleca się również stosowania w okresie karmienia piersią, ponieważ związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.
- Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat:

- Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Zastosowanie leku u młodzieży poniżej 18 lat wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Istnieje możliwość interakcji z niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi.
- Alliofil może wzmacniać działanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwplatekcyjnych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań,

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.