

Alocutan Forte, aerozol na skórę leczenie łysienia, 60ml



Cena: 42,74 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|-------------|
| Producent / Marka | Sun-Farm |
| Substancja czynna | Minoxidilum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Alocutan Forte 50 mg/ ml, aerozol na skórę, 60 ml

(Minoxidilum)

Alocutan Forte to lek w postaci areozou, który **jest przeznaczony do stosowania na skórę w leczeniu łysienia typu męskiego**. Lek stosuje się na owłosioną skórę głowy w obrębie tonsury na powierzchni od 3 do 10 cm **u mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat**.

- Łysienie androgenowe u mężczyzn cechuje się cofnięciem linii włosów na czole i skroniach z powstaniem zakoli, a następnie utratą włosów na szycie głowy.
- Leczenie Alocutan Forte stymuluje wzrost włosów i zapobiega łysieniu androgenowemu. Efekt terapeutyczny może się różnić u poszczególnych pacjentów i nie można go przewidzieć.

Wskazania:

- leczeniu łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe) w obrębie tonsury na przestrzeni o średnicy od 3 do 10 cm owłosionej skóry głowy u mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat.

Skład:

1 ml roztworu zawiera:

- **substancja czynna:** 50 mg minoksydylu (Minoxidilum),
- **pozostałe składniki to:** etanol 96% (V/V), glikol propylenowy (E 1520), woda oczyszczona.

Działanie:

Stymulowanie wzrostu włosów i przeciwdziałające postępowi łysienia androgenowego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 1 ml leku Alocutan Forte należy nakładać na objętą zmianami powierzchnię owłosionej skóry głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
- Nie należy przekraczać dawki dobowej 2 ml, niezależnie od wielkości powierzchni skóry objętej zmianami.
- Lek Alocutan Forte jest przeznaczony do zewnętrznego stosowania na suchą, owłosioną skórę głowy.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować u kobiet, z powodu pojedynczych przypadków niepokojącego, odwracalnego wzrostu włosów na twarzy podczas leczenia.
- Jeśli pacjent stosuje inne leki na owłosioną skórę głowy.
- Gdy pacjent stosuje jakikolwiek opatrunek lub bandaż na owłosioną skórę głowy.
- Jeśli u pacjenta występuje nagła i nierównomierna utrata włosów.
- Gdy u pacjenta występują jakiegokolwiek nieprawidłowości owłosionej skóry głowy, w tym łuszczyca (choroba zapalna skóry ze świądem), poparzenie słoneczne, ogolona skóra głowy lub w przypadku gdy owłosiona skóra głowy została uszkodzona przez poparzenie, lub bliznowacenie, ponieważ korzenie włosów nie są obecne.

Nie należy stosować leku Alocutan Forte:

- jeśli u pacjenta występują objawy zaburzeń ze strony układu krążenia lub zaburzenia rytmu serca,
- jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze,
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (leki przeciwnadciśnieniowe).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów - pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej.

- Obrzęk twarzy, ust lub gardła, który utrudnia połykanie i oddychanie.
- Może to być objaw ciężkiej reakcji alergicznej (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Uogólnione zaczerwienienie skóry (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Uogólnione swędzenie (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
- Ucisk w gardle (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

- swędzenie,
- nadmierne owłosienie występujące poza owłosioną skórą głowy (w tym wzrost włosów na twarzy u kobiet),
- reakcje zapalne skóry (w tym wysypka trądzikopodobna oraz wysypka skórna),
- skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu,
- obrzęk rąk i nóg,
- zwiększenie masy ciała,
- wysokie ciśnienie tętnicze,
- podrażnienie owłosionej skóry głowy takie jak kłucie,
- pieczenie, suchość,
- świąd,
- łuszczenie się,
- zapalenie mieszków włosowych.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- zawroty głowy, nudności.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- kontaktowe zapalenie skóry (zapalenie skóry związane z alergią),
- nastrój depresyjny,
- podrażnienie oka,

- przyspieszone bicie serca,
- kołatanie serca,
- obniżone ciśnienie tętnicze,
- wymioty,
- objawy w miejscu podania,
- obejmujące również uszy i twarz, takie jak swędzenie, podrażnienie skóry, ból, zaczerwienienie, obrzęk, suchość skóry, zapalna wysypka aż do możliwości łuszczenia się skóry, zapalenie skóry (dermatitis), pęcherze, krwawienie i owrzodzenie,
- przemijająca utrata włosów,
- zmiany koloru włosów,
- zmiany struktury włosów,
- ból w klatce piersiowej.

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Leku Alocutan Forte nie należy stosować razem z innymi lekami dermatologicznymi (leki przeznaczone do stosowania zewnętrznego, zawierające kortykosteroidy, retinoidy lub ditranol) lub z lekami zwiększającymi wchłanianie substancji czynnej przez skórę (absorpcja przez skórę).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Alocutan Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy wykluczyć przyczyny hormonalne, choroby podstawowe lub niedożywienie. W tych przypadkach pacjent będzie potrzebował specjalnego leczenia.
- Lek Alocutan Forte należy aplikować wyłącznie na zdrową, owłosioną skórę głowy.
- Leku Alocutan Forte nie należy stosować, jeśli przyczyna utraty włosów nie jest znana, w przypadku zakażeń owłosionej skóry głowy lub jeśli jest ona zaczerwieniona, bolesna lub występuje stan zapalny.
- W razie przeniesienia leku na miejsca inne niż owłosiona skóra głowy, w tych miejscach może wystąpić niepożądany wzrost włosów.
- Pacjenci o bardzo jasnych włosach zgłaszali pojedyncze przypadki niewielkich zmian koloru włosów w czasie jednoczesnego stosowania produktów do pielęgnacji włosów lub po kąpieli w mocno chlorowanej wodzie.
- Przypadkowe spożycie może prowadzić do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony układu krążenia. Dlatego ten lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy przerwać stosowanie leku Alocutan Forte i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- wystąpienia niskiego ciśnienia krwi,

wystąpienia jednego z następujących objawów:

- ból w klatce piersiowej,
- przyspieszona praca serca,
- osłabienie lub zawroty głowy,
- nagłe zwiększenie masy ciała o nieznannej przyczynie,
- obrzęk dłoni lub stóp,
- utrzymujące się zaczerwienienie owłosionej skóry głowy lub jej podrażnienie bądź w przypadku pojawienia się nowych niespodziewanych objawów.

Dzieci i młodzież:

- Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Ciąża i karmienie piersią:

- Lek Alocutan Forte jest wskazany do stosowania wyłącznie u mężczyzn.
- Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Alocutan Forte u kobiet w ciąży.
- Wchłonięty przez organizm minoksydyl może przenikać do mleka ludzkiego. Z tego względu leku Alocutan Forte nie wolno stosować u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Ten lek może powodować zawroty głowy lub niedociśnienie.
- W przypadku wystąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Lek Alocutan Forte zawiera glikol propylenowy (E 1520) oraz etanol 96% (alkohol)

- Ten lek zawiera 509 mg glikolu propylenowego (E 1520) w każdym ml.
- Ten lek zawiera 248 mg alkoholu (etanolu) w każdym ml.
- Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.
- Etanol może powodować pieczenie i podrażnienie oczu.
- W sytuacji przypadkowego kontaktu leku z miejscami wrażliwymi (oczy, uszkodzona skóra, błony śluzowe) należy przemyć podrażnioną powierzchnię dużą ilością wody.
- Lek Alocutan Forte zawiera etanol i glikol propylenowy, dlatego wielokrotne jego rozpylenie na włosy, zamiast na skórę głowy może prowadzić do zwiększonej suchości i (lub) sztywności włosów.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o., ul. Dolna 21, 05-092 Łomianki.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.