

Altabactin, maść, na zakażenia, małych, powierzchni, ran, 20 g



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sandoz
Substancja czynna	Bacitracinum, Neomycinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Altabactin maść 250 + 5 mg, 20 g

(Bacitracinum, Neomycinum)

Opis produktu:

Altabactin to produkt leczniczy stosowany w przypadku małych ran i skaleczeń.

Skład:

- **Substancja czynna** - bacytracyna (Bacitracinum) w postaci bacytracyny cynkowej i neomycyna (Neomycinum) w postaci neomycyny siarczanu.
- **Substancje pomocnicze** - lanolina

1 gram maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu neomycyny.

Wskazania:

Altabactin jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry jak np.:

- zakażenia niewielkich ran,
- zakażenia skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń.

Działanie:

- **Altabactin** zawiera dwie substancje o działaniu przeciwbakteryjnym: neomycynę i bacytracynę. Zastosowanie dwóch antybiotyków rozszerza zakres działania leku.
- **Altabactin** nie działa na grzyby i wirusy oraz niektóre rodzaje bakterii (Pseudomonas, Nocardia).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem.

- Nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Altabactin**:

- jeśli pacjent jest uczulony na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie;
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek;
- jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka);
- jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści do ucha zewnętrznego;
- do oczu i na błony śluzowe;
- na rany głębokie lub klute, sączące zmiany chorobowe;
- ciężkie oparzenia;
- duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bacytracyna z neomycyną stosowane zewnętrznie na skórę i błonę śluzową są na ogół dobrze tolerowane.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- reakcje alergiczne, głównie w postaci kontaktowego zapalenia skóry;
- u 50% osób uczulonych na neomycynę występuje uczulenie na inne antybiotyki aminoglikozydowe.

Występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje uczuleniowe, takie jak rumień (czerwono-sine plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami),
- nadmierna suchość i łuszczenie skóry,
- wysypka skórna i świąd;
- szkodliwe działanie na nerki, narząd słuchu lub układ nerwowy (uszkodzenie nerwu przedsionkowego, blokada nerwowomięśniowa).

Częstość nieznaną:

- Na początku leczenia może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Objawy te występują rzadko. Jeśli wystąpią, należy ograniczyć stosowanie leku aż do ustąpienia. Jeżeli ograniczenie stosowania leku nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli w trakcie stosowania leku **Altabactin** wystąpi reakcja uczuleniowa lub wtórne zakażenie, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.
- Lek można stosować tylko na małej powierzchni skóry lub ran.
- Nie należy stosować leku w dużych dawkach, gdyż substancje czynne leku wchłonięte do krwi mogą spowodować uszkodzenie nerek i słuchu.
- Należy unikać przebywania na słońcu oraz opalania się (w tym także w solarium) podczas stosowania leku, ponieważ może on powodować uczulenie na światło słoneczne i reakcje fototoksyczne.
- Przechowywać w temperaturze do 25oC. Chronić przed światłem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli:

- pacjent ma otrzymać leki do znieczulenia ogólnego;
- pacjent stosuje: inne antybiotyki (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych); leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu); opioidowe leki przeciwbólowe; leki zwiotczające mięśnie.

Nie stosować leku jednocześnie z:

- lekami mogącymi uszkadzać nerki i narząd słuchu, jak silnie działające leki moczopędne, np. furosemid, kwas etakrynowy;
- lekami mogącymi uszkadzać nerki, jak cefalosporyny lub antybiotyki aminoglikozydowe.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Masa netto: 20g

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.