

Altacet, żel, na stłuczenia, i obrzęki, 75g



Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Lek
Substancja czynna	Aluminii acetotartras
Typ produktu	

Opis produktu

Altacet, lek na stłuczenia i obrzęki 10mg/g - 75g

(Aluminii acetotartras)

Opis produktu:

Altacet to lek w postaci żelu na skórę, który działa ściągająco i przeciwobrzękowo, dlatego stosuje się go przy stłuczeniach oraz obrzękach stawowych, pourazowych a także po oparzeniach pierwszego stopnia. Żel dodatkowo zawiera mentol, który wywołuje uczucie chłodzenia.

Składniki:

- Substancja czynna - glinu octanowinian (Aluminii acetotartras).
- Substancje pomocnicze - etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 10mg octowinianu glinu.

Wskazania:

Altacet stosuje się miejscowo na skórę:

- w stłuczeniach;
- w obrzękach stawowych i pourazowych;

- w obrzękach spowodowanych oparzeniami 1 stopnia.

Działanie:

- Żel Altacet zawiera octanowinian glinu i po **zastosowaniu na skórę działa ściągająco oraz przeciwobrzękowo, łagodząc ból.** Dodatek mentolu wywołuje **efekt chłodzący.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się miejscowo, na skórę.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat: 3 lub 4 razy na dobę należy aplikować żel na czystą, suchą skórę w bolących miejscach. **Altacet** najlepiej aplikować w kilkugodzinnych odstępach, najlepiej w postaci okładów.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Altacet**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- doustnie;
- w przypadku rozległych ran;
- na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem;
- na zakażoną skórę;
- długotrwanie;
- u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne (rumień, świąd, pieczenie), które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

W razie stosowania leku na duże powierzchnie skóry, stosowania długotrwałego lub zbyt częstego, **Altacet** może powodować macerację skóry, a u osób nadwrażliwych odczyny rumieniowe, grudkowe i ziarninowe. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia objawów hiperaluminemii i hipofosfatemii w przypadku długotrwałego stosowania w ciężkiej niewydolności nerek.

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z wymienionych działań niepożądanych, w tym działań nie wymienionych w ulotce należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć obficie spłukując wodą.
- Zawarta w leku substancja pomocnicza – parahydroksybenzoesan metylu może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Nie stosować tego leku jeśli zauważy się zmianę jego wyglądu zewnętrznego lub zapachu.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci:

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 3 lat.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i maszyn:

- Brak danych o wpływie leku Altacetu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Podmiot odpowiedzialny:

Lek S.A., Podlipie 16, 95-010 Stryków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

