

Amol, płyn doustny, na skórę, 250 ml

Cena: 40,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Takeda Pharma
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Amol, płyn doustny i na skórę - 250 ml

Opis produktu:

Amol stanowi roztwór mentolu oraz mieszaniny olejków eterycznych w etanolu. Substancje czynne leku Amol to: olejek mięty pieprzowej, którego głównym składnikiem jest mentol; olejek lawendowy; olejek cytronelowy; olejek cynamonowy; olejek goździkowy; olejek cytrynowy; mentol.

Skład:

1 g leku Amol zawiera substancje czynne:

- Mentholum (mentol) - 17,23 mg;
- Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) - 1,00 mg;
- Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) - 1,00 mg;
- Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) - 2,40 mg;

- Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) - 5,70 mg;
- Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) - 2,40 mg;
- Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) - 2,40 mg.

Substancje pomocnicze - etanol 96% (v/v), woda.

Wskazania:

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

- **zewnętrznie** - w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów;
- **wewnętrznie** - w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Działanie:

- Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych.
- Amol stosowany doustnie działa rozkurczowo.
- Zastosowany na skórę działa rozgrzewająco.
- Skuteczność preparatu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

- **Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia (np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych)** - nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy na dobę.
- **Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów** - miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.
- **Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)** - od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy nie stosować leku Amol:

- w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych.

Wewnętrznie:

- w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego;
- u osób z przewlekłymi chorobami wątroby;
- u osób uzależnionych od alkoholu.

Zewnętrznie:

- na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych;
- przy chorobach skóry przebiegających z wysypką;
- na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- **Zaburzenia żołądka i jelit** - podrażnienie żołądka
- **Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej** - podrażnienia skóry i błon śluzowych, wyprysk kontaktowy, reakcje nadwrażliwości
- **Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia** - kaszel (suchy), skurcz oskrzeli.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.
- Lek Amol zawiera 67% etanolu (alkoholu). Przy zastosowaniu zalecanego dawkowania po każdym przyjęciu doustnym leku w ilości 10-15 kropli do organizmu zostanie wprowadzone do 0,46 g etanolu, co jest równoważne 7,24-10,86 ml piwa (5% v/v) i 3,02-4,53 ml wina (12% v/v).
- Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku Amol do oczu należy obficie przemyć je wodą.
- W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza, a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza.
- Po natarciu roztworem leku Amol należy starannie umyć ręce.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

- Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku Amol w

okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Ze względu na zawartość etanolu lek Amol może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po zastosowaniu doustnym leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Alkohol zawarty w leku może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.