

Anesteloc, Max, zgaga, refluks 20 mg x 14 tabletek



Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Adamed
Substancja czynna	Pantoprazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Anesteloc max 20 mg - 14 tabletek dojelitowych

(Pantoprazolum)

Opis produktu:

Anesteloc Max to produkt leczniczy w chorobie refluksowej przełyku (zgaga, kwaśne odbijanie)

Skład:

- Substancja czynna - pantoprazol
- Substancje pomocnicze - rdzeń tabletki: sodu węglan bezwodny (E170), mannitol (E421), krospowidon typu A, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian; otoczką: opadry 02H52369 [hypromelozę, glikol propylenowy, powidon K30, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172)]; otoczką dojelitową: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek żółty (E172); tusz do nadruku: szelak w etanolu, alkohol izopropylowy, żelaza tlenek czarny (E172), alkohol butylowy, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek (28%)

1 tabletkę zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego (Pantoprazolum)

Wskazania:

- w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku u dorosłych

Działanie:

- **Anesteloc Max** hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych
- **Pantoprazol** zmniejsza kwaśność treści żołądkowej

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- 1 tabletkę na dobę
- nie stosować większej dawki niż 20 mg na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

Kiedy nie stosować leku Anesteloc Max:

- uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- jeśli pacjent stosuje inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak atazanawir, nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)

Działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- łagodne polipy żołądka

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- ból głowy, zawroty głowy
- biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia
- suchość w jamie ustnej
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha
- wysypka skórna, pokrzywka, swędzenie skóry
- osłabienie, wyczerpanie, złe samopoczucie, zaburzenia snu
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zaburzenia odczuwania smaku
- zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie)
- bóle stawów, bóle mięśni
- obrzęk kończyn

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zmniejszenie liczby płytek krwi z tendencją do tworzenia się siniaków
- zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstym zakażeniom

Częstość nieznaną:

- omamy, splątanie
- zmniejszenie stężenia sodu, magnezu we krwi
- wysypka, kłucie, mrowienie, pieczenie

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A. Pieńków ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

