

# Antidral, nadmierne pocenie, stopy, pachy, dłonie płyn 50ml



Cena: 39,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Teva
Substancja czynna	Aluminii chloridum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Antidral 100mg/g płyn na skórę - 50 ml

(Aluminii chloridum)

### Opis produktu:

Antidral to produkt leczniczy do stosowania w nadmiernym poceniu się skóry - na skórze stóp, pach i dłoni

Antidral wykazuje działanie przeciwpotne - zmniejsza aktywność gruczołów potowych

### Skład:

- **Substancja czynna** - glinu chlorek 100mg (Aluminii chloridum)
- **Substancje pomocnicze** - glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza

1 gram płynu zawiera 100 mg chlorku glinu

## Wskazania:

### Lek stosuje się:

- nadmierne pocenie się skóry w obrębie stóp, dłoni i pach

## Działanie:

- **Antidral** zawiera chlorek glinu, który zmniejsza aktywność gruczołów potowych poprzez denaturację białek zawartych w gruczołach i łączenie się z włóknami fibrynowymi, stanowiącymi zakończenia gruczołów wydzielania zewnętrznego
- Po zastosowaniu płynu ciśnienie wewnątrz światła przewodu potowego wzrasta (system sprzężenia zwrotnego), w wyniku czego zahamowane zostaje wydzielanie potu z gruczołów potowych. Pozostałe składniki leku ułatwiają wchłanianie substancji czynnej oraz znacznie ograniczają możliwość wystąpienia zakażeń naskórka

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- lek do stosowania miejscowego na skórę
- lek stosuje się na noc, na skórę oczyszczoną i wysuszoną
- w przypadku mniej intensywnego pocenia się, zaleca się stosowanie płynu co drugi / trzeci dzień

## Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego
- nie stosować na skórę uszkodzoną, po goleniu lub depilacji

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Częstość nieznaną:

- podrażnienie skóry z objawami jak pieczenie, rumień, świąd

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

### Ciąża, karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 roku życia

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.