

## Apap, 500 mg paracetamol, 50 tabletek



Cena: 27,30 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Usp zdrowie
Substancja czynna	Paracetamolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Apap, paracetamol 500 mg - 50 tabletek

(Paracetamolum)

### Opis produktu:

Apap jako substancję czynną zawiera paracetamol i jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

### Skład:

- Substancja czynna - paracetamol (Paracetamolum)
- Substancje pomocnicze - wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

1 tabletkę powlekaną zawiera 500 mg paracetamolu.

### Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia:

- głowy (w tym napięciowe bóle głowy)

- menstruacyjne
- zębów
- mięśni
- kostno-stawowe
- gardła
- nerwobóle
- oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie

## Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 1-2 tabletki (500-1000 mg paracetamolu) w razie konieczności 3-4 razy na dobę  
maksymalnie 8 tabletek w ciągu doby, czyli 4 g paracetamolu na dobę.
- **Młodzież w wieku powyżej 12 lat:** tabletka (500 mg paracetamolu) w razie konieczności 3 do 4 razy na dobę.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek składnik leku,
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- jeśli stosowane są inhibitory MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu,
- jeśli występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu. Występują bardzo rzadko.

- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu), wstrząs anafilaktyczny (zawroty głowy, zaburzenia świadomości, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi),
- ciężkie reakcje skórne.

**Pozostałe działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):**

- reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, rumień, wysypka,
- nudności, wymioty, zaburzenia trawienia,

**występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):**

- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
- agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów -rodzaj białych krwinek, do całkowitego ich braku włącznie),
- skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania,
- plamica barwnikowa.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Apap może wchodzić w interakcje z:**

- innymi lekami zawierającymi paracetamol,
- inhibitorami MAO także w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania,
- zydowudyną (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu wirusem HIV),
- doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, kumaryna),
- ryfampicyną i izoniazidem (leki przeciwgruźlicze),
- lekami przeciwpadaczkowymi,
- barbituranami (leki o działaniu uspokajającym i nasennym),
- diflunisalem (lek przeciwbólowy),
- sulfipirazonem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej lub innych leków endokujących enzymy mikrosomowe wątroby),
- kofeiną - nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- należy przestrzegać 4 godzinnego odstępu pomiędzy dawkami,

- nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia,
- w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu,
- nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol,
- należy zasięgnąć opinii lekarza, jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni, a gorączka dłużej niż 3 dni.

#### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- 

Zaleca się stosowanie leku na czczo, gdyż pozwala to na przyspieszenie jego działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego.

#### Dzieci i młodzież:

- Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (ograniczenie wynika z postaci leku).

#### Ciąża, karmienie piersią:

- 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

## Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.