

## Apap dla dzieci Forte zawiesina 85 ml



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	US Pharmacia
Substancja czynna	Paracetamolum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Apap forte dla dzieci, 40 mg/ml, zawiesina doustna - 85 ml

(Paracetamolum)

### Opis produktu:

Apap dla dzieci Forte 40 mg/ml to lek w postaci zawiesiny doustnej stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki

### Skład:

- **Substancja czynna** - paracetamol (Paracetamolum)
- **Substancje pomocnicze** - kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)]

## Wskazania:

Lek Apap dla dzieci Forte 40 ml/ml stosuje się u dzieci o masie ciała do 40 kg, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku):

- do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki (wysokiej temperatury)
- do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu
- bólu głowy
- bólu gardła
- bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy, lub przeziębienia
- bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego
- bólu zęba
- bolesnego ząbkowania
- bólów menstruacyjnych
- bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym
- gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej
- bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych

## Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza. Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta.**

- Zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/ kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/ kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/ kg masy ciała co 4 godziny
- Niemowlęta i dzieci o masie ciała do 40 kg, młodzież, dorośli: 15 mg/ kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/ kg masy ciała co 4 godziny

**W przypadku wysokiej gorączki (powyżej 39°C), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem**

Lek podaje się doustnie, za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania. Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkakrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą)

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie należy stosować leku APAP dla dzieci forte jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak:**

- obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności, czy spadek ciśnienia krwi

**Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):**

- umiarkowana senność; nudności; wymioty

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):**

- zawroty głowy; senność; zdenerwowanie; uczucie palenia w gardle; biegunka; ból brzucha (w tym skurcze i zgaga); zaparcie; ból głowy; nasilone pocenie; zmniejszona ciepłota ciała (dreszcze)

**Rzadko występujące działanie niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):**

- zaczerwienienie skóry

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):**

- choroby układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby i sporadyczne przypadki braku białych krwinek, zaburzenia w tworzeniu komórek krwi w szpiku kostnym); u pacjentów predysponowanych skurcz oskrzeli; reakcje skórne

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Apap dla dzieci forte może wchodzić w interakcje z:**

- warfaryną lub acenokumarolem
- glikopironium i propanteliną

- doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
- fenytoiną, fenobarbitalem, prymidonem, lamotryginą
- chloramfenikolem
- izoniazydem i ryfampicyną
- metoklopramidem i domperidonem
- probenecydem
- propranolem
- kolestyraminą
- zydowudyną

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie butelki
- Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się oznaki zepsucia
- Należy przestrzegać 6-godzinnego odstępu między dawkami
- W przypadku wysokiej gorączki (>39o C), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów, utrzymujących się dłużej niż 2 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem
- Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi

Lek Apap dla dzieci Forte zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216) oraz etanol

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem:

- APAP dla dzieci forte jest lekiem gotowym i może być przyjmowany wraz z jedzeniem i pićciem (poza napojami alkoholowymi).
- Podczas leczenia zawiesiną APAP dla dzieci forte, nie pić napojów alkoholowych. Spożywanie posiłku nie wykazało wpływu na skuteczność leku, jednak przyjmowanie leku po posiłku może opóźnić jego działanie

### Dzieci i młodzież:

- Nie wolno stosować leku u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, chyba, że jest to zalecone przez lekarza

### Ciąża, karmienie piersią:

- APAP dla dzieci forte może być stosowany w ciąży tylko po uważnym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka. W takim przypadku, zalecane jest dokładne przestrzeganie dawki i czasu trwania stosowania.
- W trakcie ciąży, paracetamolu nie należy stosować przez długi czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami
- Lek APAP dla dzieci forte w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas karmienia piersią

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

## Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 @85

50-507 Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.