

Apteo Symetykon max, 30 kapsułek



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Producent / Marka | Synoptis |
| Typ produktu | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Wyrób medyczny

Apteo, Symetykon MAX, 30 kapsułek miękkich

Wyrób medyczny **Symetykon MAX** przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach.

Symetykon MAX przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Wskazania:

- Symetykon MAX zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia ich pękanie, a następnie wydalanie.

Dawkowanie i sposób podawania:

Kapsułki Symetykon MAX stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

Dorośli: doraźnie, 1 kapsułka 2-4 razy dziennie. Maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).

Dzieci powyżej 12. roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Skład:

240mg symetykonu w kapsułce miękkiej żelatynowej. Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol.

Ostrzeżenia:

- Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów.
- **Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.** Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawkę pojedynczą można uzupełnić w każdej chwili.
- Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków.
- W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Symetykon Max i innych preparatów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4 - godzinny odstęp
- Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, o ile to możliwe poniżej 25°C, i powyżej 10°C w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i źródłami ciepła.
- Okres ważności dotyczy zamkniętego i właściwie przechowywanego produktu.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

- Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu

Producent:

Curtis Health Caps S.A. Wysogotowo, ul. Batorowska 52, 62-081 Przeźmierowo

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa