

Aromatol, płyn z olejkami eterycznymi, 150 ml



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Aromatol, płyn - 150 ml

Opis produktu:

Lek Aromatol to koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej.

Skład:

100 g roztworu zawiera substancje czynne:

- lewomentol - 1,72, g
- olejek cytrynowy - 0,57, g
- olejek z kory cynamonowca cejlońskiego - 0,24, g
- olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu) - 0,24, g

- olejek lawendowy - 0,24, g
- olejek cytronelowy - 0,1 g
- olejek goździkowy - 0,1 g

Substancje pomocnicze: etanol 96%, woda oczyszczona. Zawartość etanolu 63,0 - 72,0 % (v/v).

Wskazania:

- **Zewnętrznie:** w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu (do nacierań, do inhalacji lub płukania gardła), w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach przez owady.
- **Wewnętrznie:** w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych) np. wzdęciach, niestrawności.

Działanie:

- Działanie leku Aromatol opiera się na tradycyjnym zastosowaniu składników.
- **Lek jest alkoholową mieszaniną mentolu i olejków eterycznych** - olejku cytrynowego z cytryny zwyczajnej (Citrus limon), olejku cynamonowego z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum), olejku z mięty polnej (Mentha arvensis), olejku lawendowego z lawendy lekarskiej (Lavandula officinalis), olejku cytronelowego z palczatki cytronelowej (Cymbopogon nardus) i olejku goździkowego z goździkowca korzennego (Caryophyllus aromaticus). **Mentol wykazuje działanie żółciopędne i spazmolityczne.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie Aromatolu dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat zależy od wskazania medycznego.

Stosowanie na skórę:

- **Do nacierań** - 1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem Aromatol, aż powierzchnia skóry stanie się sucha.
- W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów: miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lakiem Aromatol.

Do płukania gardła:

- Około 5 ml (1 łyżeczka) leku dodać do około 250 ml (szklanki) ciepłej wody. Płukać gardło i jamę ustną 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie w postaci inhalacji (przy przeziębieniu):

- Około 5 ml (1 łyżeczka) leku dodać do około 250 ml (szklanki) gorącej wody i wdychać przez kilka minut powstające opary. Inhalacje powtarzać do 3 razy na dobę.

Stosowanie doustne:

W dolegliwościach trawiennych (np. niestrawności, wzdęciach) 1 do 3 razy na dobę przyjmować 10 do 15 kropli leku zmieszanych z

wodą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz niepełne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.
- Nie stosować wewnętrznie w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego, u osób z ciężkimi uszkodzeniami wątroby lub uzależnionych od alkoholu.
- Nie stosować zewnętrznie na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i otwartych ranach, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błonę śluzową oraz w okolicach oczu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy u osób wrażliwych kontakt z olejkami eterycznymi może powodować skórne odczyny uczuleniowe, a czasami także zaburzenia układu oddechowego (np. kaszel, skurcz oskrzeli).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek Aromatol zawiera etanol, częste stosowanie zewnętrzne może powodować podrażnienie i suchość skóry.
- Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku Aromatol do oczu, należy przemyć je obficie wodą i zwrócić się do lekarza.
- W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości: trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza, a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza.
- Po nacieraniu lekiem lub jego roztworem należy starannie umyć ręce.
- Lek zawiera 63,0 -72,0 % (V/V) etanolu. Jeden mililitr leku zawiera ok. 0,57 g etanolu, 10 kropli zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 2,2 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 5,3 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu, co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką.
- Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową.

Stosowanie u dzieci:

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na brak pełnej oceny bezpieczeństwa stosowania oraz zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży i u karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Stosowanie leku może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Alkohol zawarty w leku może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.