

Asmag forte, 50 tabletek



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmapol
Substancja czynna	Magnesium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Asmag Forte, 34 mg jonów magnezu - 50 tabletek

(Magnesii hydroaspartas)

Opis produktu:

Lek Asmag Forte w postaci tabletek to preparat z magnezem, który jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów.

Składniki:

- **Substancja aktywna** - magnez wodorooasparagianu czterowodnego
- **Substancje pomocnicze** - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa, metyloceluloza.

1 tabletkę zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg magnezu wodorooasparagianu czterowodnego.

Wskazania:

Niedobór magnezu.

Działanie:

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę.

- Podanie doustne.
- Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nadwrażliwość na magnezu wodorooasparaginian czterowodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, metyloceluloza).
- Hipermagnezemia,
- ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny
- antybiotykoterapia,
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok),
- bradykardia,
- myasthenia gravis,
- biegunka.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.
- **Asmag Forte** zawiera laktozę jednowodną, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Asmag Forte może wchodzić w interakcje z:

- antybiotykami z grupy tetracyklin,
- lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi hydroksykumaryny,
- lekami lub suplementami diety zawierającymi fosforany, wapń i żelazo.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o., ul. Święty Wojciech 29, Poznań.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.