

Aspirin C, 20 tabletek musujących, Delfarma



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Bayer
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Aspirin C, 400 mg + 240 mg, 20 tabletki musujące, Delfarma

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum

Opis:

Aspirin C to lek w postaci tabletek musujących, który zawiera składnik o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Zawartość witaminy C dodatkowo wzmacnia system odpornościowy organizmu. Musująca postać tego leku na przeziębienie i gripę przyspiesza jego wchłanianie.

Skład:

Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).

1 tabletki musująca zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwas askorbowego.

Substancje pomocnicze:

sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

od 1 do 2 tabletek musujących. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza:

1 tabletkę. W razie konieczności dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletek na dobę. Tabletki musujące należy rozpuścić w szklance wody i wypić musujący płyn. Przyjmować po posiłkach. Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Wskazania:

Aspirin C stosuje się w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu oraz w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Działanie:

Lek **Aspirin C** działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Witamina C dodatkowo wzmacnia system odpornościowy organizmu.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Aspirin C**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
- jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,
- jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
- u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- bóle żołądka i brzucha,
- zgaga,
- nudności i wymioty,
- niestrawność,
- zawroty głowy i szумы uszne,
- zwiększone ryzyko krwawień,
- łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę,
- wysypka, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania **Aspirin C** należy omówić z lekarzem jeśli u pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, występuje zaburzona czynność wątroby, jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa.
- Lek **Aspirin C** zawiera sód, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
- Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy i inne reakcje nadwrażliwości.
- Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku **Aspirin C**.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Aspirin C może wchodzić w interakcje z:

- metotreksatem,
- lekami przeciwzakrzepowymi,
- lekami stosowanymi w chorobach serca,
- lekami przeciwcukrzycowymi,
- lekami moczopędnymi,
- lekami przeciw nadciśnieniowym.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią:

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Lek **Aspirin C** jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka.

Nie należy stosować produktów zawierających kwas acetylosalicylowy u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka matki.

Wpływ na płodność:

Aspirin C należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

U dzieci poniżej 12 roku życia leków zawierających kwas acetylosalicylowy nie należy stosować, a u młodzieży powyżej 12 roku życia leki zawierające kwas acetylosalicylowy można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Import równoległy:

Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź.

Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu:

Bayer Bulgaria EOOD 5, Rezbarska Street, 1510 Sofia, Bulgaria.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.