

Atussan syrop 1,5 mg/ml, syrop przeciwkaszlowy, 150ml

Cena: 17,99 PLN



Opis słownikowy

Producent /
Marka Polfarmex S.A.

Substancja
czynna Butamiratum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

ATUSSAN, 1,5 mg/ml, syrop przeciwkaszlowy, 150ml

(Butamirati citras)

Skład:

Substancja czynna:

- Butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras).

5 ml syropu zawiera 7,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

- sorbitol ciekły, niekryształujący E 420 (1 ml syropu zawiera 450 mg sorbitolu); glicerol E 422 (1 ml syropu zawiera 250 mg glicerolu); sodu benzoesan E 211 (1 ml syropu zawiera 1 mg soli kwasu benzoesowego); etanol (1 ml syropu zawiera 1,392 mg etanolu).

Pozostałe substancje pomocnicze:

- Sacharyna sodowa, Aromat pomarańczowy płynny (zawiera m.in. etanol), Kwas cytrynowy jednowodny, Sodu cytrynian, Woda oczyszczona

Wskazania:

- Produkt leczniczy stosowany w leczeniu objawowym kaszlu różnego pochodzenia

Działanie:

- Cytrynian butamiratu, substancja czynna produktu leczniczego Atussan, jest lekiem przeciwkaszlowym. Cytrynian butamiratu ma właściwości przeciwcholinergiczne oraz rozszerza oskrzela, co ułatwia oddychanie. Nie powoduje uzależnienia ani przyzwyczajenia.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi

1 tydzień.

- **Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:** 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- **Młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- **Dorośli:** 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Produkt leczniczy należy przyjmować przed posiłkiem.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego:

- Rzadko (?1/10 000 do