

AulinDol 30mg, żel przeciwbólowy przeciwzapalny, skręceniiie stawów, ostre zpalanie ścięgien 100g



Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini Pharma
Substancja czynna	Nimesulidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

AulinDol, 30 mg/g żel - 100 g

(Nimesulidum)

Opis produktu:

AulinDol to lek w żelu stosowany w celu łagodzenia bólu i obrzęków po urazach stawów i ścięgien. Przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Skład:

- Substancją czynną leku jest nimesulid (Nimesulidum).

1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu.

- Pozostałe składniki: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogolglycerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), trietanolamina, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Objawowe leczenie bólu związanego ze skręceniami stawów i z ostrym urazowym zapaleniem ścięgien.

Działanie:

-

Nimesulid należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania na skórę.
- Dorośli: nakładać cienką warstwę (zazwyczaj w dawce 3 g, co odpowiada 6 – 7 cm wyciśniętego żelu) na bolesne miejsce 2 – 3 razy na dobę i wcierać do całkowitego wchłonięcia.
- Czas trwania leczenia: 7 do 15 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NPLZ), a także u dzieci poniżej 12 roku życia.

- Nie stosować na skórę pękniętą, otartą lub w przypadku zakażeń skóry.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Należy przerwać stosowanie leku AulinDol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna: obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła bądź też trudności z oddychaniem.
- W przypadku wystąpienia swędzenia i/lub zaczerwieniania skóry oraz wysypki należy przerwać stosowanie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Należy zachować ostrożność jeśli pacjent choruje na astmę, ma poważne zaburzenia wątroby, nerek lub serca, jeśli u pacjenta występuje krwawienie z żołądka lub owrzodzenie żołądka, ma problemy z krzepliwością krwi oraz u pacjentek jest w ciąży lub karmiących piersią.
- Nie należy stosować produktu leczniczego AulinDol w pobliżu oczu lub na błony śluzowe; w razie przypadkowego kontaktu należy natychmiast zmyć żel wodą. Nie należy stosować produktu pod opatrunki okluzyjne.
- Po zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce.
- Ze względu na ryzyko nadwrażliwości na światło należy chronić skórę przed słońcem i nie korzystać z solarium.
- Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego).

- Może brudzić na żółto leczoną skórę, a także ubrania stykające się z leczonym obszarem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie zaleca się stosowania leku AulinDol u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie stosować na skórę z innymi lekami podawanymi miejscowo.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 14 dni.

Podmiot odpowiedzialny:

ANGELINI PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Aleje Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym