

# Axotonil, aerozol do uszu, na ból, zapalenie, ucha, 10ml

Cena: 26,45 PLN



## Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Cholini salicylas
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Axotonil 440mg/ml aerozol do uszu 10 ml

### (Cholini salicylas)

## Opis produktu:

Axotonil zawiera substancję czynną salicylan choliny, który jest pochodną kwasu salicylowego i należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia ucha u osób dorosłych.

## Skład:

- Substancja czynna - choliny salicylan (Cholini salicylas).
- Substancje pomocnicze - glicerol, etanol 96%, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 440 mg choliny salicylanu.

## Wskazania:

- Wskazaniami do zastosowania leku Axotonil jest **leczenie stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego, które objawiają się bólem, świądem i zaczerwienieniem**. Wykorzystuje się go do zmiękczenia zalegającej wydzieliny przed płukaniem przewodu słuchowego zewnętrznego.

## Działanie:

- Salicylan choliny, który jest substancją czynną leku Axotonil stosowany miejscowo **ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz wykazuje słabe działanie bakteriobójcze wobec niektórych drobnoustrojów**.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli: w celu krótkotrwałego, miejscowego leczenia objawowego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin przez okres nie dłuższy niż 3 dni.
- W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.
- Produkt leczniczy stosuje się miejscowo, do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

- Produktu leczniczego Axotonil nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz w przypadku wcześniej rozpoznanego uszkodzenia błony bębenkowej, krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha, silnego bólu ucha z pogorszeniem słuchu.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Częstość nieznaną** (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd skóry).

U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem leczenia produktem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

- W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości w ciągu 3 dni stosowania leku i wystąpienia dodatkowych objawów, takich jak: gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, wyciek z ucha lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym, należy skonsultować się z lekarzem.

- Lek Axotonil zawiera alkohol (etanol) - może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Jest łatwopalny. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów).
- Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa.
- Nie stosować doustnie ani na otwarte rany.

#### Ciąża i karmienie piersią

- Lek może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza.

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Produktu leczniczego nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- Jednoczesne stosowanie doustnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może nasilać miejscowe działanie produktu leczniczego.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25 °C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesiące.
- Jest łatwopalny. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów).

## Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., Ul Partyzancka, Pabianice

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.v

