

# Azulan, płyn, dostosowania, w jamie ustnej, na skórę, 90g



Cena: 14,50 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Wrocław
Substancja czynna	Matricaria chamomilla
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Azulan Płyn do stosowania w jamie ustnej i na skórę - 90 g

(*Matricaria chamomilla*)

## Opis produktu:

Azulan to lek w formie płynu do krótkotrwałego stosowania na skórę i błony śluzowe. Zawiera w składzie wyciąg z rumianku i stosuje się go zewnętrznie w stanach zapalnych błon śluzowych oraz skóry lub (po podaniu doustnym) przy skurczach przewodu pokarmowego, jako środek pomocniczy. Azulan jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

## Skład:

Substancje czynne: wyciąg płynny z *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* (L.) (Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:2).

Substancje pomocnicze - nie zawiera

1 ml leku zawiera 1 ml wyciągu płynnego z *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* (L.) (Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:2); ekstrahent: etanol 70% (V/V).

Lek zawiera 60–68% (V/V) etanolu.

## Wskazania:

Zastosowanie Azulanu zależy od drogi podania leku.

- Zewnętrznie podaje się go w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych m.in. do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła oraz w stanach zapalnych dziąseł.
- Wewnętrznie, czyli po podaniu doustnym, Azulan stosuje się jako środek pomocniczy w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, gdyż wykazuje działanie rozkurczające i wiatropędne oraz przeciwzapalne.
- Wymienione wyżej wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania produktu.

## Działanie:

- Azulan ma właściwości przeciwzapalne.
- Stosowany wewnętrznie działa rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego (działanie wiatropędne), a także zmniejsza w nim stan zapalny.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie Azulanu zależy od drogi podania.

U osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosuje się:

- **Zewnętrznie:** 10 % r – r wodny do płukania i okładów (1 część Azulanu + 9 części przegotowanej, chłodnej wody)
- **Wewnętrznie:** 3 razy dziennie wypijać przed posiłkiem 5 ml (1 łyżeczka) leku rozcieńczonego w 1 szklanki wody.

Jeśli po 7 dniach stosowania produktu leczniczego nie nastąpiła poprawa lub chory czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

- Nie należy stosować preparatu jeśli występuje uczulenie na kwiaty rumianku lub inne rośliny rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae/ Compositae).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Azulan mogą wystąpić:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd skóry, rumień, obrzęk, zwiększona wrażliwość na promieniowanie słoneczne – częstość nieznana;

- zaburzenia układu immunologicznego: szok anafilaktyczny, astma – częstość nieznana.

Należy skonsultować z lekarzem jeśli wystąpią inne działania niepożądane, niewymienione w tej ulotce.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera 60 – 68 % v/v etanolu. Jedna dawka, czyli 5 ml zawiera ok. 2,58 g etanolu.
- Ze względu na zawartość etanolu, lek może działać szkodliwie u osób z chorobą alkoholową, a także u osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką.

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Ze względu na zawartość etanolu w preparacie stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Ze względu na zawartość etanolu, nie należy stosować preparatu u dzieci do lat 12.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Preparat zawiera 60 – 68 % v/v etanolu. 1 dawka (5 ml) zawiera ok. 2,58 g etanolu.
- Zażycie wewnętrznie produktu może spowodować osłabienie zdolności psychofizycznych.
- Nie zaleca się przyjmowania wewnętrznie leku przed podróżą, alkohol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Przy podaniu doustnym, lek należy stosować przed posiłkami

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

Masa netto:90g

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.