


Bals Sulphur, żel, zwyrodnienia stawów, RZS, zwichnięcia 300 g



Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Sulphur Zdrój

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Bals Sulphur żel - 300 g

Opis produktu:

Bals Sulphur Żel to produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym do stosowania w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów, zapaleniem stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz po urazach stawów z towarzyszącym bólem i obrzękiem

Składniki:

- Substancja czynna - 2,1% woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa i jodkowa
- Substancje pomocnicze - etanol 96o, woda oczyszczona, mentol, etylu parahydroksybenzoesan, metyloceluloza

Wskazania:

- choroba zwyrodnieniowa stawów
- zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
- bólowe zespoły szyjne, barkowe i lędźwiowo-krzyżowe
- bóle i obrzęki po stłuczeniach, zwichnięciach i rehabilitacja po urazach narządu ruchu
- pomocniczo w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)

Działanie:

- Właściwości lecznicze żelu **Bals Sulphur** wiążą się z obecnością solanki, w której obecne są związki siarki (siarka (II), jon wodorosiarczkowy, siarka koloidalna) oraz inne jony jak jony wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza.
- Miejscowa aplikacja działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, zwiększa resorpcję z ognisk zapalnych.
- Jony siarkowe wchłonięte przez skórę biorą udział m.in. w syntezie kwasu chondroitynosiarczkowego - składnika budującego chrząstkę stawową

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- żel do stosowania miejscowego na skórę
- 2-3 razy dziennie wcierać żel w okolice chorych stawów i mięśni, lekko masując
- należy stosować 2-3 tygodnie

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Bals Sulphur Żel**:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować na uszkodzoną skórę

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie leku, poinformować o nich lekarza

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

Ciąża i karmienie piersią:

- w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w grupie wiekowej dzieci, nie zaleca się stosowania tego leku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ EXIM Bohaterów Warszawy 116a 28-100 Busko Zdrój

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.