

Bengay, Maść Przeciwbólowa, ból, mięśni, stawów, kręgosłupa, 50 g



Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	McNeil
Substancja czynna	Methylis salicylas, Mentholum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Bengay 150 mg + 100 mg/g, maść przeciwbólowa - 50 g

(Methylis salicylas, Mentholum)

Opis produktu:

BenGay maść przeciwbólowa to lek zmniejszających dolegliwości bólowe mięśni, stawów, kręgosłupa. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Skład:

- Substancjami czynnymi leku są salicylan metylu (Methylis salicylas) i mentol (Mentholum).

1 g maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 g mentolu

- Substancje pomocnicze: stearynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbat 85, sorbitol tristéarynian, trietyloamina, woda oczyszczona.

Wskazania:

- BenGay stosuje się w bólu i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym. Wskazaniem do zastosowania leku są również bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Działanie:

-

Lek BenGay działa miejscowo przeciwbólowo.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek podaje się na skórę bolącego miejsca. Dawkowanie maści Bengay u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat to 3 do 4 razy dzienna aplikacja leku na skórę, na chorobowo zmienione miejsce delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia.
- Stosowanie leku BenGay bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nie należy stosować leku:

- u pacjentów z nadwrażliwością na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do podania leku jest podrażnienie skóry i otwarte rany.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 pacjentów): obrzęk naczynioruchowy, duszność (jako reakcję uczuleniową), pęcherze, pieczenie, rumień, podrażnienie, ból, parastezję (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry), świąd i wysypkę oraz oparzenia w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.
- Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.
- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek BenGay może wchodzić w interakcje z:

- kwasem acetylosalicylowym,

- lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną).

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu zamieszczonego na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym