

Benzacne, żel, trądzik 10% - 30g



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Takeda
Substancja czynna	Benzoylis peroxidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Benzacne 100mg/g - żel na trądzik

(Benzoylis peroxidum)

Opis produktu:

Benzacne w postaci żelu o działaniu przeciwtrądzikowym, przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę

Skład:

- Substancja czynna - benzoilu nadtlenuk (Benzoylis peroxidum)
- Substancje pomocnicze - karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona

1 g żelu zawiera 100 mg benzoilu nadtlenuku

Wskazania:

- leczenie trądziku pospolitego

Działanie:

- **Benzoilu nadtlenek** po zastosowaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej naskórka i hamuje rozwój bakterii beztlenowych *Propionobacterim acne*, będących jedną z przyczyn trądziku pospolitego.
- Działa także złuszcząco na naskórek, zmniejsza liczbę zaskórników

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- stosować raz lub dwa razy na dobę

Zwykle w ciągu 2 do 3 pierwszych tygodni leczenia stosuje się lek o zawartości nadtlenu benzoilu 50mg/g i w razie konieczności kontynuuje leczenie lekiem o zawartości nadtlenu benzoilu 100mg/g

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- egzema
- przewlekłe zapalenie skóry
- oparzenia skóry
- nie stosować leku na skórę podrażnioną i na otwarte rany
- należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV i słońce
- lek może powodować odbarwienie włosów i tkanin
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat
- ciąż
- laktacja

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

W trakcie stosowania leku Benzacne może wystąpić:

- przesuszenie lub nadmierne łuszczenie się skóry
- zaczerwienienie skóry

- uczucie ciepła lub delikatnego kłucia w miejscu nałożenia leku

Objawy te mogą pojawić się w pierwszym tygodniu leczenia i nie stanowią one wskazania do odstawienia leku. W przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć częstość stosowania leku Benzacne

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

- alergiczne zapalenie kontaktowe lub bolesne podrażnienie skóry
- pieczenie skóry
- wysypka skórna

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Dzieci i młodzież:

- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- nie należy nakładać leku na okolicę gruczołu sutkowego w przypadku karmienia piersią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie zamrażać

Podmiot odpowiedzialny:

Takeda Pharma Sp.z o.o. ul. Prosta 68 00-838 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.