

# Biostymina, w infekcjach górnych dróg oddechowych, 10 ampułek x 1 ml



Cena: 27,99 PLN

## Opis słownikowy

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Producent / Marka | Phytofarm |
| Substancja czynna | Aloe sp.  |
| Typ produktu      |           |

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Biostymina, płyn doustny, 1 ml - 10 ampułek

(Aloe arborescens extractum)

#### Opis produktu:

- Biostymina jest lekiem zawierającym wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego i jest przeznaczona do stosowania doustnego.
- Produkt jest stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

#### Skład:

- **Substancją czynną** leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum) (1:4) – 1 ml, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

- **Pozostałe składniki** (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.

## Wskazania:

Wskazaniami do zastosowania leku są:

- tradycyjnie, infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,
- pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.

## Działanie:

- Wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego wspomaga układ odpornościowy.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Lek stosować wyłącznie doustnie, nie stosować w formie iniekcji!**

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania.

- Dorośli: 1 ml (1 ampułka) na dobę lub co drugi dzień.
- Młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat: 0,5 ml (pół ampułki) na dobę lub co drugi dzień.
- Dzieci w wieku poniżej 5 lat: Nie zaleca się stosowania.

Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

Czas trwania cyklu terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4 - tygodniowej przerwie.

Powstający osad nie ma wpływu na działanie produktu.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biostymina**

- Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

**Pominięcie zastosowania leku Biostymina**

- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Biostymina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną,
- jeśli u pacjenta stwierdzono postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Interakcje z innymi lekami nie są znane.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odkrztuszaniem ropnej płwociny lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem

### Dzieci i młodzież

- Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 5 lat i młodzieży.
- Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat

### Biostrymina z jedzeniem, pić i alkoholem

- Brak danych.

### Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Nie stosować z powodu braku danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie ustalono wpływu leku na płodność.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

- Brak danych na temat jakiegokolwiek szkodliwego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

## Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.