

## Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (Import - InPharm)



Cena: 13,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	INPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	Bisacodylum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (Import - InPharm)

(Bisacodylum)

### Opis produktu:

- Bisacodyl VP to produkt leczniczy w postaci tabletek dojelitowych działających przeczyszczająco i wiatropędnie.

### Skład:

- Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum)
- Substancje pomocnicze : rdzeń tabletki: Skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna; Otoczek: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, polisorbat 2 , talk, tytanu dwutlenek (E 171) czeriwń koszelinowa (E 124) lak, symetykon

Jedna tabletki dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu

### Wskazania:

Lek Bisacodyl VP jest stosowany:

- w zaparciach różnego pochodzenia: nawykowych i przewlekłych zaparciach u obłożnie chorych, nawykowych zaparciach w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym i innych
- opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi

## Działanie:

- Lek **Bisacodyl VP** jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym.
- Działa na jelito grube poprzez: nasilenie skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych, zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Krótkotrwałe leczenie zaparc:

- **Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:** doustnie, 5 mg do 10 mg (1-2 tabletki) 1 raz na dobę (zwykle na noc)
- **Dzieci w wieku 4-10 lat:** doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc)

### Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi

- **Dzieci w wieku 4-10 lat:** doustnie, 5mg (1 tabletkę) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisacodylu doodbytniczo w postaci czopka
- **Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:** doustnie, 10 mg (2 tabletki),rano oraz 10 mg(2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisacodylu doodbytniczo w postaci czopka

### Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

- Nie ma konieczności modyfikacji dawki

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popić wodą

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Bisacodyl VP** :

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisacodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (miedzy innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego)
- Jeśli u pacjenta występuje choroba Leśniowskiego-Crohna
- Jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie odwodnienie

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości

## Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Bardzo rzadko** (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktycznymi.
- **Częstość nieznana** (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle brzucha i biegunka.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

- Długotrwałe i systematyczne stosowanie bisakodylu może prowadzić do nasilenia zaparcia i problemów z wypróżnieniem bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających. Jednocześnie mogą pojawić się zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
- W przypadku, gdy stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny zaparcia.
- Leku nie należy stosować w przypadku występowania bólu brzucha o nieznannej przyczynie oraz wymiotach lub nudnościach.
- U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i/lub omdlenia w trakcie defekacji.
- Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 10. roku życia, u których występuje przewlekłe zaparcie.
- Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie leku Bisacodyl VP z:

- Lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Lek Bisacodyl VP należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny od przyjęcia leku zobojętniającego sok żołądkowy
- Glikozydami naparstnicy, może nasilać ich działanie poprzez zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej, szczególnie jeśli jest stosowany w dużych dawkach
- Lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy lek Bisacodyl VP stosowany jest w dawkach większych niż zalecane

Lek Bisacodyl zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Bisacodyl VP zawiera czerwień koszeulinową (E 124) lak. Lek może powodować reakcje alergiczne

## Lek Bisacodyl VP z jedzeniem i pić

- Jednoczesne stosowanie leku Bisacodyl VP z mlekiem może zwiększać ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Lek Bisacodyl VP należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny od wypicia mleka

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest wiązy lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty Przed zastosowaniem leku

- Leku Bisacodyl nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią o ile lekarz nie zaleci inaczej

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Lek Bisacodyl nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny w Bułgarii, kraju eksportu:

Mylan EOOD Office bulding "Serdika Offices" Sitnykovo Blvd. 48, fl.7, 1505 Sofia, Bułgaria

## Import równoległy:

InPharm Sp. z o.o., ul. Strumykowa 28/11, 03-458 Warszawa

### Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.