


# Bisacodyl VP, 5 mg, lek, na, zaparcia różnego pochodzenia, 30tabletek



Cena: 16,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	PHARMASWISS
Substancja czynna	Bisacodylum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych

(Bisacodylum)

## Opis produktu:

Bisacodyl VP to produkt leczniczy w postaci tabletek dojelitowych działających przeczyszczająco i wiatropędnie.

## Skład:

- **Substancją czynną leku** jest bisakodyl (Bisacodylum)
- **Substancje pomocnicze** : Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.

Jedna tabletkę dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu

## Wskazania:

- Lek Bisacodyl VP jest stosowany **doraźnie** w zaparciach różnego pochodzenia: nawykowych i przewlekłych zaparcia u obłożnie chorych, nawykowych zaparciach w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym. Polecany jest również w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi

## Działanie:

- Lek **Bisacodyl VP** jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym działającym bezpośrednio na jelito grube. W wyniku działania na nerwy w ścianie jelita nasila skurcze jelit i pobudza ruchy perystaltyczne. Lek zwiększa również ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co wzmacnia jego działanie przeczyszczające.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:** doustnie, **1-2 tabletki na noc**.

**Dzieci w wieku 4-10 lat:** doustnie, **1 tabletkę na noc**.

- U osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki.
- Preparat należy połączyć w całości i obficie popić wodą, nie rozgryzać ani nie rozkruszać.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Bisacodyl VP** w przypadku wystąpienia:

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego),
- bólów brzucha o nieznannej etiologii z obecnością nudności i wymiotów,
- choroby Leśniowskiego-Crohna,
- wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- ciężkiego odwodnienia.

## Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Bardzo rzadko** (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktycznymi.

**Częstość nieznaną** (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- bóle brzucha i biegunka.

U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

- Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających, oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej (w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
- Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.
- Nie stosować w bólach brzucha o nieznannej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.
- U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.
- Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami

### Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Leku **Bisacodyl VP** nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować u dzieci do 4 lat.

### Stosowanie leku z jedzeniem i pićm

- Stosowanie leku **Bisacodyl VP** jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 godzinę po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek **Bisacodyl VP** może wchodzić w interakcje z:

- lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
- glikozydami naparstnicy,
- lekami moczopędnymi,
- kortykosteroidami.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA, Jankovcova 1569/2c, Praga, Republika Czeska

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.