

Bobotic Forte, krople doustne, na kolki, wzdęcia, niestrawność, dla dzieci, od 28 dnia życia, 30ml



Cena: 35,20 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Simeticonum
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Bobotic Forte krople doustne, 5 ml

Wyrób medyczny Bobotic Forte przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego.

Skład:

Symetykon, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, guma ksantanowa, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Zastosowanie:

- Wyrób medyczny **Bobotic Forte** przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat **w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego.**

- Pomocniczo w przygotowaniu niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Właściwości produktu:

Wyrób medyczny **Bobotic Forte**:

- obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach, ułatwia ich łączenie i pękanie, usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu,
- zawiera symetykon, który po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Sposób użycia:

- **Bobotic Forte** należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.
- Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu.
- Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub nakropić na smoczek przed podaniem go dziecku.
- Odmierzoną ilość płynu można wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, stosowanej odżywki (mleka) lub innego niegazowanego płynu.

W celu łagodzenia objawów takich jak: kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność oraz innych objawów związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego:

- Niemowlęta (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat:

3 krople (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 18 kropli na dobę (120 mg symetykonu).

- Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

6 kropli (40 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli na dobę (240 mg symetykonu). Podawana ilość może być modyfikowana zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Podawana ilość może być modyfikowana zgodnie ze wskazaniem lekarza.

W przypadku przygotowania do badań diagnostycznych:

W dniu poprzedzającym badania należy przyjąć:

- Niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat:

3 krople (20 mg symetykonu) 2 razy na dobę

- Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

6 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę

Rano w dniu badania, na czczo, należy przyjąć:

- Niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat :

3 krople (20 mg symetykonu)

- Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

6 kropli (40 mg symetykonu)

Czas stosowania wyrobu medycznego Bobotic Forte jest zależny od utrzymywania się dolegliwości.

Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem można stosować do 4 tygodni.

Ważne:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- Nie stosować u noworodków (tzn. do 28 dnia życia)
- Brak doniesień o działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie są znane interakcje z innymi lekami w docelowej grupie wiekowej.
- W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- Z uwagi na fakt, że produkt przeznaczony jest do stosowania u niemowląt, wyrobu nie powinno się stosować równoległe z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować większych dawek wyrobu niż zalecane.
- Podczas stosowania wyrobu nie należy pic napojów gazowanych

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny
- Posiada oznakowanie **CE 1434**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Posiada instrukcję obsługi **w języku polskim**

- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu produktu.
- Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharama S.A. ul. Pelplińska 19, 82-200 Starogard Gdański