

Boiron, Arnigel żel, 120 g



Cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product
Typ produktu	

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Arnigel, żel 120g

Skład:

Substancje czynne w 100 g żelu:

- Arnica montana TM 7 g

Substancje pomocnicze:

- Karbomer, sodu wodorotlenek 10%, etanol 96 % (V/V), woda oczyszczona

Wskazania:

Leczenie miejscowe następstw niewielkich urazów (siniaki, stłuczenia) u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Polecany również w bólach mięśni pojawiających się po intensywnym wysiłku fizycznym.

Działanie:

Wskazania tego leku odpowiadają tradycyjnemu zastosowaniu homeopatycznemu Arnica montana

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia: stosować od 1 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób uczulonych na Arnica montana mogą wystąpić miejscowe reakcje alergiczne: zaczerwienienie i swędzenie skóry, wypryski, pokrzywka. W związku z zawartością alkoholu, częste stosowanie leku może spowodować podrażnienia i miejscowe wysuszenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera etanol.
- 100 mg żelu zawiera 21,42 mg etanolu.
- Stosować wyłącznie zewnątrznie: podanie na skórę. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.
- Ze względu na zawartość etanolu nie stosować: na błony śluzowe, oczy, sączące się zmiany skórne, zainfekowane skaleczenia lub rany, pod opatrunkiem ochronnym, u dzieci poniżej 1 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Odradza się jednoczesnego stosowania tego leku i leków p/zakrzepowych z grupy antagonistów witaminy K.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.