

Boiron Camilia roztwór doustny 10 pojemników minimisów PhPoint

Cena: 26,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	PHARMAPOINT S.A.
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Lek bez recepty

Camilia, roztwór doustny, 10 pojemników jednodawkowych minimisów

Homeopatyczny produkt leczniczy

Import równoległy

Opis produktu:

Lek Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Skład:

- **Substancjami czynnymi są:** Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5 CH
- **Substancje pomocnicze:** woda oczyszczona

1 pojemnik jednodawkowy (minims - 1 ml) zawiera:

- Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg
- Phytolacca decandra 5CH 333,3 mg
- Rheum 5 CH 333,3 mg

Wskazania:

- bolesne ząbkowanie

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- stosować doustnie.
- 3-6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa)
- **nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę.**
- leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni
- jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.
- można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób użycia:

- Stosować doustnie.
- Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.
- Otworzyć saszetkę.
- Oderwać jeden pojemniczek.
- Przekręcić i ułamać końcówkę.
- Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.
- Zamknąć dokładnie aluminiową saszetkę zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek Camilia należy stosować doustnie.
- nie wkraplać do oka i ucha
- nie wstrzykiwać
- w przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem
- nie stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- brak specjalnych wymagań

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Przechowywanie:

- **przed otwarciem saszetki:** brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
- **po otwarciu saszetki:** nieużywane pojemniki jednodawkowe (minimisy) należy przechowywać w saszetce z folii aluminiowej.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
- termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- **Uwaga! Zachowaj ulotkę, informacja na opakowaniu bezpośrednim w języku obcym!**

Podmiot odpowiedzialny:

Boiron 2 avenue de louest Lyonnais F-69510 Messimy

Importer równoległy: Medezin Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

