

Boiron, Camilia, roztwór doustny na bolesne ząbkowanie, 30 dawek



Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------|
| Producent / Marka | Boiron |
| Substancja czynna | Productum compositum |
| Typ produktu | Lek homeopatyczny |

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Camilia, roztwór doustny - 30 dawek

Import równoległy - Medezin

Kraj eksportu - Belgia

Opis produktu:

Camilia® jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Składniki:

Substancje czynne - Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH.

Substancje pomocnicze - woda oczyszczona.

1 ml leku (1 pojemniczek) zawiera:

- Chamomilla vulgaris 9 CH - 333,3 mg
- Phytolacca decandra 5 CH - 333,3 mg
- Rheum 5 CH - 333,3 mg

Wskazania:

- Lek Camilia jest wskazany w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

Działanie i właściwości:

- Camilia® to moc składników pochodzenia naturalnego.
- Przyniesie ulgę w wielu objawach bolesnego ząbkowania u Twojego maluszka.
- Camilia® nie zawiera lidokainy!
- Neutralny smak, dobrze tolerowany przez najmłodszych.
- Higieniczne podanie leku, bez dotykania bolących dziąseł.
- Odpowiednia ilość leku pozwalająca na jego podanie bez ryzyka zakrztuszenia.
- Możliwość posiadania leku zawsze przy sobie- na spacerze, w podróży, na nocnej szafce.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 - 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa).

- Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.
- **Maksymalna dawka dobową:** 6 pojemniczków (minimsów).
- **Czas stosowania:** leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Sposób podawania:

1. Otworzyć saszetkę.
2. Oderwać jeden pojemniczek.
3. Przekręcić i ułamać końcówkę.
4. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.
5. Zamknąć dokładnie aluminiową saszetkę zawierającą pozostałe minimisy (pojemniczki).

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie wkraplać do oczu i uszu.
- Nie wstrzykiwać.
- W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
- Minimsy są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie należy ich przechowywać po otwarciu.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.