

Boiron, Oscillococcinum, granulki, 30 dawek



Cena: 125,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Producent / Marka | Boiron |
| Substancja czynna | Homeopathic medicinalis product |
| Typ produktu | Lek homeopatyczny |

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Oscillococcinum, granulki - 30 dawek

Opis produktu:

Oscillococcinum® jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5 oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Składniki:

Substancja czynna - Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml w 1g granulek.

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.

Wskazania:

Lek Oscillococcinum® zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak:

- uczucie drapania w gardle,
- uczucie rozbicia,
- uczucie zimna.

Działanie:

Oscillococcinum® ma postać granulek, które rozpuszczają się pod językiem i nie wymagają popijania płynem.

Jedną z nich można mieć zawsze przy sobie i przyjmować o każdej porze w dowolnym miejscu, tak aby zastosować lek natychmiast jak pojawią się pierwsze objawy przeziębienia i grypy.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

- **Początek infekcji** - zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.
- **Rozwinięta infekcja** - po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza. Granulki można

rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Czas stosowania - jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39 o C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.
- Oscillococcinum® zawiera sacharozę i laktozę.

Dzieci i młodzież:

-

Przed rozpoczęciem stosowania Oscillococcinum® u dzieci w wieku do 5 lat należy omówić to z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić

się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.