

Boiron, Stodal, syrop homeopatyczny na kaszel, 200 ml

Cena: 26,19 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Boiron
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Boiron, Stodal, syrop homeopatyczny na kaszel - 200 ml

Opis produktu:

Stodal syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

Składniki:

Substancje czynne w 100 g syropu:

- Pulsatilla 6CH - 0,95 g,
- Rumex crispus 6CH - 0,95 g,
- Bryonia 3CH - 0,95 g,
- Ipeca 3CH - 0,95 g,

- Spongia tosta 3CH - 0,95 g,
- Sticta pulmonaria 3CH - 0,95 g,
- Antimonium tartaricum 6CH - 0,95 g,
- Myocardium 6CH - 0,95 g,
- Coccus cacti 3CH - 0,95 g,
- Drosera TM - 0,95g

Substancje pomocnicze: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

Wskazania:

Stodal syrop lek stosowany w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

Działanie:

Stodal syrop zawiera 10 substancji czynnych i jest stosowany w łagodzeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli - 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.
- Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat - 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.
- Dzieci w wieku do 6 lat - według wskazań lekarza.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stodal ® syrop zawiera etanol (alkohol) i sacharozę.
- Lek zawiera 1,74 % v/v etanolu (alkohol).
- Lek zawiera 0,107 g kwasu benzoesowego w 100 ml syropu.
- 5 ml syropu zawiera 0,069 g etanolu, 3,75 g sacharozy i 0,00537 g kwasu benzoesowego.

Dzieci i młodzież:

-

Przed rozpoczęciem stosowania leku Drosetux u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Podmiot odpowiedzialny:

BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.