


Boldaloin, niestrawność, zaparcia, 30tabletek



Cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Wrocław
Substancja czynna	Aloe sp., Boldinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Boldaloin 23,6mg + 1,0mg - 30 tabletek

(Aloes Extractum siccum + Boldinum)

Opis produktu:

Boldaloin to produkt leczniczy wspomagający wydzielanie żółci i soku żołądkowego oraz regulujący częstotliwość wypróżnień.

Skład:

Substancjami czynnymi są: wyciąg suchy z Aloe ferox Miller (alona przyławkowa) DER 2:1 (rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona) oraz boldyna (Boldinum).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, guma arabska, glicerol, talk, magnezu stearynian.

1 tabletkę zawiera 23,6 mg wyciągu z alony przyławkowej oraz 1 mg boldyny oraz 3,6-4,4 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na barbaloinę.

Wskazania:

- Uczucie pełności w jamie brzusznej,
- Zaburzenia wydzielania żółci i soku żołądkowego,

- Lekkie skurczowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- W regulacji wypróżnień (łagodne zaparcia związane np. z dietą).

Działanie:

- **Boldaloin** wykazuje działanie przeczyszczające dzięki zawartości pochodnych hydroksyantracenu (pobudzają perystaltykę jelita grubego) oraz pobudza wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Jako środek żółciopędny i pobudzający wydzielanie soków żołądkowych: Dorośli: 3 razy na dobę po 1 tabletkę.

Młodzież powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wieku: 1-2 tabletki na dobę.

Jako łagodny środek regulujący wypróżnienia: Od 1 do 3 tabletek jednorazowo, wieczorem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Boldaloin**:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku.
- w przypadku marskości wątroby, niedrożności dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, zwężenia przewodu pokarmowego, atonii jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, chorób zapalnych jelita grubego (np. choroba Crohna), bólów brzucha nieznanego pochodzenia, niewydolności nerek, bieguncie, zaburzeniach równowagi elektrolitowej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

•

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia nerek i dróg moczowych (zmiana zabarwienia moczu).

•

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): hipokaliemia, kolka żółciowa, reakcja alergiczna.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Boldaloin może wchodzić w interakcje z:

- lekami moczopędnymi, adrenokortykosteroidami, korzeniem lukrecji (ryzyko hipokaliemii przy stosowaniu dużych dawek **Boldaloin**),
- lekami przeciwartmicznymi,
- innymi lekami przeczyszczającymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Legalon 140 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Nie zaleca się długotrwałego stosowania ze względu na możliwość osłabienia perystaltyki jelit.
- W przypadku kamicy żółciowej, lek stosować wyłącznie przy konsultacji z lekarzem.
- Stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania leków moczopędnych.
- Unikać stosowania podczas miesiączki.
- Lek zawiera sacharozę - nie stosować u pacjentów, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.
- Nie stosować u osób poniżej 12 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u osób poniżej 12 roku życia.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A, ul. Św. Mikołaja 65/68

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.