

Bravera Control, aerozol na skórę, 8 ml



Cena: 66,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|------------|
| Producent / Marka | Aflofarm |
| Substancja czynna | Lidocainum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Bravera Control aerozol - 8 ml

Lek Bravera Control zawiera substancję powszechnie stosowaną w medycynie od wielu lat - lidokainę. Bravera Control w postaci aerozolu na skórę, roztwór, działa miejscowo znieczulająco, zmniejszając wrażliwość penisa na dotyk.

Skład:

- Substancja czynna - Substancją czynną jest lidokaina.
- Substancje pomocnicze - kwas stearynowy, izopropylu mirystynian, glikolu dietylenowego monoetylowy eter.

1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.

Jednokrotne rozpylenie zawiera 7,87 mg lidokainy.

Wskazania:

- Bravera Control przeznaczony jest dla mężczyzn, których dotyka problem przedwczesnego wytrysku.

- Bravera Control umożliwia przedłużenie przedłużenie stosunku, poprzez opóźnienie wytrysku.

Działanie:

Bravera Control zawiera **lidokainę – substancję o działaniu znieczulającym**. Jak Bravera Control powoduje przedłużenie stosunku? Lidokaina hamuje wyzwalanie i przewodzenie impulsów wzdłuż włókien nerwowych. **Zastosowanie aerozolu na penisa sprawia, że staje się on mniej wrażliwy na dotyk i bodźce**. Wytrysk ulega opóźnieniu, a stosunek wydłużeniu. Lidokaina łatwo się wchłania przez błony śluzowe.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Spray stosuje się bezpośrednio na penisa – spryskuje się trzon i żołądź prącia (po zsunięciu napletka). Pojemnik trzymać pionowo. **Zaleca się od 3 do 7 naciśnień pompki. Lek należy nanieść od 5 do 15 minut przed stosunkiem. Płyn, który nie wchłonął się po 5 minutach, należy zetrzeć z penisa.**

Sposób użycia powinien być dobrany do indywidualnych potrzeb. **Należy jednak zawsze stosować najmniejsze skuteczne dawki oraz nie przekraczać dawki dobowej – 22 naciśnień pompki.**

Lek należy aplikować tak, aby nie przedostał się do oczu, uszu, nosa czy ust.

Przeciwwskazania:

- Aerozolu Bravera Control nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na lidokainę, substancje pomocnicze, amidowe leki miejscowo znieczulające – również jeśli uczulenie występuje u partnerki/partnera.
- Aerozolu nie można stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- Leku nie powinni stosować mężczyźni, których partnerki są w ciąży.

Działania niepożądane :

- Skutkiem ubocznym stosowania leku Bravera control mogą być **miejscowe podrażnienia skóry lub wysypki**, zdarza się to jednak bardzo rzadko. Nie odnotowano innych działań niepożądanych przy właściwym stosowaniu.
- Jeśli zostaną zastosowane większe dawki niż zalecane lub w przypadku nadwrażliwości na lidokainę, bardzo rzadko mogą wystąpić: objawy zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, pobudzenie, nerwowość, objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności. Działania niepożądane o nieznanym częstości występowania zostały opisane w ulotce dołączonej do leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby (obecnie lub w przeszłości) należy się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Jeśli w trakcie stosowania aerozolu wystąpi wysypka lub podrażnienie (także u partnerki/partnera) należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.
- Aerozol nie powinien mieć kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, gardła, nosa. W przypadku gdy aerozol dostanie się do oczu – należy je szybko przemyć zimną wodą. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi, lek może wywołać uczucie drętwienia.

- **W trakcie stosunku płciowego, lek może przedostać się z penisa do pochwy lub odbytu** (dlatego ważne jest usuwanie nadmiaru leku z prącia) – może to wywołać uczucie drętwienia. **Należy zachować ostrożność póki działanie nie minie.**
- Po pierwszym otwarciu Bravera Control zachowuje ważność przez 3 miesiące.
- Bravera Control nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bravera Control może wchodzić w interakcję z:

- lekami nasercowymi (przeciwyarytmicznymi);
- lekami przeciwpadaczkowymi;
- lekami antycholinergicznymi (na przykład stosowanymi w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej);
- lekami przeciwnadciśnieniowymi;
- barbituranami (na przykład nasennymi oraz stosowanymi w leczeniu padaczki);
- beta-blokerami (lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz regulującymi rytm serca);
- lekami zwiotczającymi mięśnie;
- lekami sympatykomimetycznymi (na przykład stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, astmy, przeziębienia).

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.