

Buerlecithin Vita, płyn, lecytyna, pamięć i koncentracja, 1000 ml



Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Orifarm Healthcare

Substancja
czynna Lecithinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Vita Buerlecithin, płyn doustny - 1000 ml

Opis produktu:

Vita Buerlecithin® to lek w postaci płynu doustnego o złożonym składzie. Preparat wzmacniający zawiera w składzie lecytynę sojową oraz kompleks witamin z grupy B.

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotnian, amid kwasu nikotynowego.
- **Substancje pomocnicze** - etanol 96%, sacharoza, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilowa, sodu wodorotlenek, mannitol, woda oczyszczona.

100 ml produktu zawiera:

- 10,4 g - **lecytyny sojowej** (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd),
- 4,8 mg - **witaminy B2** (w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny),
- 3,5 mg - **witaminy B6** (w postaci chlorowodoru pirydoksyny),
- 2,5 µg - **witaminy B12** (cyjanokobalaminy),
- 20 mg - **sodowego D-pantotenianu**
- 35 mg - **amidu kwasu nikotynowego**.

Wskazania:

- osłabienia pamięci i koncentracji,
- stanów stresowych, bezsenności, pobudzenia nerwowego,
- stanów wyczerpania fizycznego i psychicznego
- pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
- objawów niedoboru witamin z grupy B,
- stanów rekonwalescencji po przebytej chorobie,
- pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
- zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
- zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Działanie:

Vita Buerlecithin zawiera lecytynę, która:

- korzystnie wpływa na czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięśni.
- Jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz wątroby.
- Dzięki swoim właściwościom emulgującym zapobiega tworzeniu się złogów tłuszczowych w organizmie.

Witaminy zawarte w produkcie uzupełniają dzienne zapotrzebowanie oraz wspomagają działanie lecytyny.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci od 12 lat - 20 ml 3 razy na dobę.

- Przed użyciem butelkę wstrząsnąć.
- W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Vita Buerlecithin:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- u dzieci poniżej 12 lat,
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
- u osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową i uszkodzeniami mózgu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- wysypka, pokrzywka

Częstość nieznaną:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Vita Buerlecithin może wchodzić w interakcję z:

- lekami psychotropowymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Produkt zawiera 16,4 % alkoholu.** Jednorazowa dawka 20 ml produktu wprowadza do organizmu 2,6 g alkoholu.
- Dawka dobową zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.
- Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji produktu są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

Ciąża i karmienie piersią:

- Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Ze względu na zawartość alkoholu należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- **Po otwarciu butelki nie przechowywać dłużej niż 12 tygodni.**
- Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.
- Nie zamrażać.

Podmiot odpowiedzialny:

Orifarm Healthcare A/S, Dania.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.