


Calcium, Polfarmex, syrop, truskawkowy, profilaktyka, niedobór, wapnia, 150 ml



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfarmex
Substancja czynna	Calcium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Calcium Polfarmex, syrop o smaku truskawkowym - 150 ml

SMAK TRUSKAWKOWY

(Calcii glubionas + calcium lactobionas)

Opis produktu:

Lek Calcium Polfarmex, zawierający wapń w postaci łatwo przyswajalnych soli organicznych: glubionianu i laktobionianu, uzupełnia niedobory wapnia w organizmie.

Skład:

- Substancje czynne:** 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas).
- Pozostałe składniki to:** sacharozę, kwas cytrynowy jednowodny, substancję poprawiającą smak i zapach truskawkowy płynny, sodu benzoosan, wodę oczyszczoną.

100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas) oraz substancje pomocnicze.

Wskazania:

- LekCaldum Polfarmex wskazany jest do stosowania w profilaktyce i leczeniu następstw niedoborów wapnia w organizmie.

Działanie:

- Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Doustnie

- **Dzieci w wieku od 2 do 11 lat:** 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę
- **Dzieci w wieku od 12 do 17 lat:** 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dobę
- **Dorośli:** 15 ml dwa do trzech razy na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

Nie należy stosować leku **Calcium Polfarmex**:

- W przypadku występowania hiperkalcemii
- W przypadku występowania hiperkalcjiurii
- W niewydolności nerek znacznego stopnia

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- Duże dawki mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia).
- Długotrwałe stosowanie może być przyczyną hiperkalcemii lub hiperkacjiurii.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nasilenie działania sulfonamidów, glikozydów naparstnicy, zaburzenie wchłaniania tetracyklin i związków fluoru.
- Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia.
- Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Po pierwszym otwarciu opakowania syrop należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny:

Plofarmex S.A., Józefów 9, Kutno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.