

Calcium-Sandoz wapń Forte, 20 tabletek musujących



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sandoz
Substancja czynna	Calcium carbonicum, Calcium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Calcium-Sandoz Forte 500 mg, 20 tabletek musujących

Calcium-Sandoz Forte 500 mg to produkt leczniczy stanowiący źródło wapnia, które jest podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do budowania i prawidłowego funkcjonowania kości. Lek ten wskazany jest do stosowania w leczeniu i zapobieganiu niedoborów wapnia zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. **Może być stosowany również w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.**

Skład:

1 tabletkę zawiera:

- **substancje czynne:** 1132 mg wapnia laktogluconianu i 875 mg wapnia węglanu (co odpowiada 500 mg wapnia),
- **substancje pomocnicze:** kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy [zawiera: alkohol benzylowy, glukozę, sorbitol (E 420) i dwutlenek siarki (E 220)], aspartam (E 951), makrogol 6000 i sodu wodorowęglan.

Wskazania:

- Jest wskazany w **zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia** i może być stosowany jednocześnie z innymi preparatami w celu

zapobiegania i leczenia schorzenia nazywanego **osteoporozą** (osłabienie kości),

- Może być również stosowany jednocześnie z witaminą D3 w leczeniu krzywicy (rozmiękanie rosnących kości u dzieci) i osteomalacji (rozmiękanie kości u dorosłych).

Działanie:

- Zawarty w leku Calcium-Sandoz Forte wapń pełni fundamentalną rolę w utrzymaniu efektywnej pracy nerwów, mięśni, serca oraz w procesie krzepnięcia krwi.
- Wapń jest ważny dla właściwej aktywności hormonalnej.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- **Dorośli:** jedna tabletkę musującą (jedna dawka) raz, dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 500-1500 mg wapnia).
- **Dzieci:** jedna tabletkę musującą (jedna dawka) raz lub dwa razy na dobę (co odpowiada 500-1000 mg wapnia).
- Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu.
- Tabletki nie należy połykać ani żuć.
- Lek można przyjmować z posiłkiem lub między posiłkami.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie (nadwrażliwość) na wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Zwiększoną ilość wapnia we krwi (hiperkalcemia).
- Zwiększoną ilość wapnia w moczu (hiperkalciuria).
- Choroby nerek, w tym: kamienie w nerkach (kamica nerkowa) i odkładanie się wapnia w tkankach nerek (zwapnienie nerek).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Calcium-Sandoz Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów alergicznych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w przełykaniu.

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- nudności,
- biegunka,

- bóle brzucha,
- zaparcie,
- wzdęcie,
- wymioty,
- świąd,
- zaczerwienienie i (lub) pieczenie skóry.

Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- zwiększona zawartość wapnia we krwi (hiperkalcemia),
- zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria).

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
- Lek Calcium-Sandoz Forte można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią w przypadku, gdy występuje niedobór wapnia. Zalecana dobową dawką wapnia (włączając żywność i suplementy) dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią wynosi 1000-1300 mg. W okresie ciąży i karmienia piersią dobową dawką wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg.
- Wapń przenika do mleka kobiecego, ale nie powoduje to żadnych działań niepożądanych u karmionego piersią dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Lek Calcium-Sandoz Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Leku nie należy zażywać w ciągu 2 godzin od spożycia produktów bogatych w kwas szczawiowy i fitynowy, takich jak: szpinak, rabarbar i pełne ziarna zbóż.

Ważne:

- Lek Calcium-Sandoz Forte zawiera aspartam, sól, sorbitol, alkohol benzyłowy, dwutlenek siarki i glukozę.

- Lek Calcium-Sandoz Forte może być stosowany u pacjentów z cukrzycą (1 tabletkę musującą zawiera 0,002 wymiennika węglowodanowego - WW).
- Ten lek zawiera 68,45 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletkę musującą. Odpowiada to 3,4% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.
- Ten lek zawiera 180 nanogramów alkoholu benzylowego w każdej tabletkę musującą. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Podawanie alkoholu benzylowego małym dzieciom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych w tym zaburzeń oddychania (tzw. "gasping syndrome"). Nie podawać noworodkom (do 4 tygodnia życia) bez zalecenia lekarza. Nie podawać małym dzieciom (w wieku poniżej 3 lat) dłużej niż przez tydzień bez zalecenia lekarza lub farmaceuty.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, a także pacjenci z chorobami wątroby lub nerek, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).
- Ten lek zawiera 210 nanogramów dwutlenku siarki, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.
- Ten lek zawiera 30 mg aspartamu (E 951) w każdej tabletkę musującą. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie z powodu jej nieprawidłowego wydalania.
- Ten lek zawiera 630 mikrogramów sorbitolu w każdej tabletkę musującą.
- Ten lek zawiera glukozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Może on również wpływać szkodliwie na zęby.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.