

Calgel, żel do stosowania na dziąsła, dzieci niemowlęta, 10g@



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	INPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	Lidocainum, Cetylpyridinium
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Calgel, żel do stosowania na dziąsła, 10g

Import równoległy - Inpharm Sp. z o.o.

(Lidocainum, Cetylpyridinium)

Opis produktu:

Żel Calgel to lek do smarowania dziąseł zmniejszający ból i stan zapalny towarzyszący ząbkowaniu. Żel posiada 2 składniki aktywne, miejscowo znieczulającą lidokainę oraz lekko odkażający chlorek cetylopirydynowy. **Calgel łagodzi podrażnienia dziąseł podczas ząbkowania niemowlaków.**

Skład:

- **Substancją czynną** kremu są chlorowodorek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum), chlorek cetylopirydynowy (Cetylpyridinii chloridum).

1 gram żelu zawiera 3,3 mg chlorowodoru lidokainy i 1 mg chlorku cetylopirydynowego.

- **Pozostałe składniki:** sorbitol roztwór 70%, ksylitol, etanol 96%, glicerol, hydroksyetyloceluloza 5000, makrogol glicerolu hydroksystearynian, makrogolu eter laurylowy 9, makrogol 300, sacharyna sodowa, lewomentol, aromat ziołowy, karmel (E150), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Stosowanie leku Calgel wskazane jest w stanach zapalnych podczas ząbkowania.

Działanie:

- Żel Calgel działa dwukierunkowo. Za właściwości znieczulające odpowiada lidokaina, a chlorek cetylopirydynowy odkaża. W efekcie Calgel łagodzi dokuczliwe objawy ząbkowania.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosuje się w jamie ustnej.
- Dawkowanie żelu na ząbkowanie Calgel u dzieci i niemowląt od 3 miesiąca życia to niewielka ilość leku, około 7,5 mm, nałożona na dziąsła.
- Żel należy aplikować czubkiem czystego palca i delikatnie wcierać w dziąsła w miejscu wyrzynania się zębów.
- Zabieg ten można powtarzać nie wcześniej niż po 2 godzinach od poprzedniej aplikacji. Nie stosować więcej niż 6 razy w ciągu doby.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na denotywir, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Calgel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): uczulenie (w tym zapalenie skóry), reakcje w miejscu podania (w tym rumień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Rumianek może wywoływać reakcje uczuleniowe. Nadwrażliwość na rumianek objawia się zazwyczaj utrudnionym oddychaniem lub reakcjami anafilaktycznymi występującymi po wypiciu ziołowego naparu zawierającego rumianek lub skórnymi reakcjami alergicznymi na preparaty zawierające rumianek.
- Lek Calgel zawiera sorbitol, etanol, sól.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić

się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci i niemowląt, nie należy stosować u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować: np. innych lekach przeciwwirusowych na opryszczkę i półpasiec, o innych maściach na opryszczkę w nosie, wargową i intymną, również tych dostępnych bez recepty.

- Odnotowano interakcje między podawaną dożylnie lidokainą oraz doustnym prokanamidem (lek przeciwaritmiczny), doustną fenytoiną (lek przeciwпадaczkowy), karbamazepiną, doustnym propranololem (lek obniżający ciśnienie krwi, stosowany w zaburzeniach rytmu serca, lek uspakajający) oraz diuretykami (leki moczopędne) (bumetamid, furosemid, tiazydy)

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.
- Okres użycia po pierwszym otwarciu tuby: 1 miesiąc

Podmiot odpowiedzialny:

MCNEIL Healthcare, Dublin, Irlandia

Import Równoległy:

Inpharm Sp z o.o. Strumykowa, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym