

## Canephron x 60 tabletek drażowanych



Cena: 52,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Bionorica
Substancja czynna	Levisticum officinale, Centaurium erythraea, Rosmarinus officinalis
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Canephron - 60 tabletek drażowanych

### Opis produktu:

Canephron to lek dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia, który stosuje się wspomagająco w leczeniu łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych.

Lek można również stosować zapobiegawczo w osadzeniu się piasku nerkowego

### Skład:

- **Substancja czynna** - 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka); 18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii); 18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu)
- **Substancje pomocnicze** - wapnia węglan, olej rycynowy pierwszego tłoczenia; dekstryna, barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171), glukoza ciekła (substancja sucha), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, wosk Montana glikolowy, Powidon K 25, Powidon K 30, Szelak, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, talk

### Wskazania:

- wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych
- zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego

## Działanie:

- tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego okresu stosowania

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem Canephron można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:**

- po 2 tabletki 3 razy na dobę (maksymalna dawka dobową wynosi 6 tabletek)
- tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody

Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- nadwrażliwość na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych
- w przypadku występowania wrzodów żołądka
- jeśli występują obrzęki spowodowane zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Zaburzenia żołądka i jelit:**

- zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

**Zaburzenia układu immunologicznego:**

- reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- lek zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozę: (1 tabletkę zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed jego zastosowaniem należy poradzić się lekarza

### Ciąża, karmienie piersią:

- Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku podczas ciąży.
- Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Bionorica Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6B 01-209 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

