

Canesten, 500 mg, 1 kapsułka dopochwowa



Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Bayer
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Canesten, 500 mg - 1 kapsułka dopochwowa miękka + aplikator

(Clotrimazolum)

Opis produktu:

Dopochwowa kapsułka Canesten® to terapia grzybiczej infekcji intymnej ukryta tylko w 1 dawce, wygodna w użyciu dzięki aplikatorowi i miękkiej żelowej kapsułce dopochwowej.

Skład:

Składnik aktywny - klotrymazol

Substancje pomocnicze - wypełnienie kapsułki: wazelina biała, parafina ciekła; otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

1 kapsułka zawiera 500 mg klotrymazolu.

Wskazania:

Canesten można stosować u dorosłych kobiet oraz w wieku powyżej 16 lat.

Objawy grzybiczej infekcji intymnej:

- Świąd
- Obrzęk lub zaczerwienienie
- Upławy serowate o kwaśnym lub neutralnym zapachu
- Pieczenie
- Zaczerwienienie
- Bolesne oddawanie moczu

Działanie:

- Canesten zawiera przeciwgrzybiczy klotrymazol z grupy imidazoli.
- Działanie leku polega na hamowaniu wzrostu oraz niszczeniu grzybów.
- Canesten działa na drożdżaki, pleśnie czy dermatofity.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Canesten podaje się dopochwowo.
- Zalecane dawkowanie leku Canesten u kobiet dorosłych oraz dziewcząt powyżej 16 lat to 1 kapsułka umieszczona głęboko w pochwie przed snem.
- Stosowanie produktu należy zakończyć przed rozpoczęciem miesiączki.
- Nie stosować leku w czasie menstruacji.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100 osób):

- pieczenie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 1 000 osób):

- ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy.

Częstość nieznana:

- złuszczenie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy:

- do zakażenia doszło po raz pierwszy,
- jest to 4 przypadek zakażenia u pacjentki w ostatnim roku,
- występuje gorączka co najmniej 38°C,
- występuje ból dolnej części brzucha, pleców,
- pacjentka posiada cuchnące upławy,
- pojawiają się nudności,
- pacjentka krwawi z pochwy i/lub jednocześnie odczuwa ból w ramionach.

Podczas leczenia nie stosować tamponów, środków plemnikobójczych, płukania pochwy czy innych dopochwowych produktów. W tym czasie należy powstrzymać się od stosunków płciowych, aby nie zakazić partnera.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer SP. z. o.o., Aleje Jerozolimskie 158, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

