

## Cepan, krem, wyciąg z cebuli, blizny 35g



Cena: 23,45 PLN

### Opis słownikowy

Producent /  
Marka Zakłady farmaceutyczne Unia

Substancja  
czynna Productum compositum

Typ produktu

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Cepan krem w tubie 35 g

(Productum compositum)

### Opis produktu:

Cepan to produkt leczniczy stosowany w profilaktyce blizn, w tym przerostych blizn, a także przyspiesza regenerację tkanki.

### Skład:

- **Substancja czynna** - wyciąg etanolowy z cebuli (*Alii cepae extractum fluidum*), wyciąg z rumianku (*Chamomillae extractum*), heparyna sodowa (*Heparinum natricum*), alantoina (*Allantoinum*).
- **Substancje pomocnicze** - mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; woda oczyszczona.

100 g kremu zawiera 20 g wyciągu z cebuli, 5 g wyciągu z rumianku, 5000 IU heparyny soweiej, 1 g alantoiny.

### Wskazania:

- Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych.

- Leczenie przykurczy.
- Leczenie blizn powiek.
- Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.

## Działanie:

- **Cepan** powoduje spłaszczenie, zblednięcie blizny, a także uelastycznia ją.
- **Cepan** może także zapobiegać powstawaniu blizn, wpływa na tkankę bliznowatą (zmiękcza, rozluźnia), wspiera również strukturę kolagenu.
- Dodatkowo zmniejsza również reakcję zapalną, przyspiesza regenerację tkanki, zmniejsza uczucie napięcia skóry i świąd.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania na skórę.
- Krem należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.
- W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy

**Dzieci i dorośli:** 2-3 razy na dobę, nakładać cienką warstwę, lekko masując.

W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować leku **Cepan** w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Częstość nieznaną:

- Na początku leczenia może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry. Objawy te występują rzadko. Jeśli wystąpią, należy ograniczyć stosowanie leku aż do ustąpienia. Jeżeli ograniczenie stosowania leku nie spowoduje ustąpienia podrażnienia skóry, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku stosowania kremu w okolicy powiek, należy zachować ostrożność aby krem nie dostał się do oczu.
- Lek zawiera alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan - mogą powodować reakcje alergiczne lub miejscowe reakcje skórne.

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- **Cepan** można stosować w ciągu **6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku**, nie przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

#### Ciąża, karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

## Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "Unia" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.